# Colección de cultivares autóctonos gallegos de manzano (*Malus xdomestica)* del Banco de Germoplasma de Mabegondo

S. Pereira-Lorenzo, J. Ascasíbar-Errasti, A.M. Ramos-Cabrer, J.Piñeiro-Andión

# Colección de cultivares autóctonos gallegos de manzano (*Malus xdomestica)* del Banco de Germoplasma de Mabegondo

S. Pereira-Lorenzo*[1], J. Ascasíbar-Errasti[1], A.M. Ramos-Cabrer[1], J.Piñeiro-Andión[2]

[1]Escola Politécnica Superior

Universidad de Santiago de Compostela

Campus de Lugo

27002 Lugo

*Autor para la correspondencia: Tfno: 982 25 23 03; Fax: 982 24 18 35

e-mail: spereira@lugo.usc.es

[2]Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo

Apdo. 15

15080 A Coruña

**Lugo 2001**

ÍNDICE

**RESUMEN** ..... **3**

**SUMMARY** ..... **4**

**INTRODUCCIÓN** ..... **5**

**MATERIAL Y MÉTODOS** ..... **12**

MATERIAL VEGETAL ..... 12

ISOENZIMAS ..... 15

FICHAS VARIETALES ..... 15

MODELO DE FICHA VARIETAL ..... 16

**RESULTADOS Y DISCUSIÓN** ..... **21**

**I. CULTIVARES PRESELECCIONADOS** ..... **33**

GRUPO DE LAS AMARILLAS ..... 35

GRUPO DE LAS BICOLORES ..... 54

GRUPO DE LAS ROJAS ..... 84

**II CULTIVARES A CONSERVAR EN EL BANCO DE GERMOPLASMA** ..... **94**

CONCLUSIONES ..... 391

**AGRADECIMIENTOS** ..... **393**

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS** ..... **394**

**ANEJO FOTOGRÁFICO: CULTIVARES PRESELECCIONADOS Y A CONSERVAR EN EL BANCO DE GERMOPLASMA** ..... **397**

# Colección de cultivares autóctonos gallegos de manzano (*Malus xdomestica)* del Banco de Germoplasma de Mabegondo

# Collection of authoctonous Galician apple cultivars (*Malus xdomestica)* of the Germplasm Bank of Mabegondo

S. Pereira-Lorenzo

J. Ascasíbar-Errasti

A.M. Ramos-Cabrer

J. Piñeiro-Andión

**RESUMEN**

En España existen tres Bancos de Germoplasma de cultivares de manzano autóctono, localizados en Aragón, Asturias y Galicia. Los cultivares locales tuvieron mucha importancia en la producción de manzana en el pasado y, actualmente, en la producción de manzana de sidra. La colección gallega de cultivares locales de manzano fue establecida en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, A Coruña, entre los años 1978 y 1981. Este Banco incluye actualmente 408 introducciones procedentes de las cuatro provincias gallegas injertadas sobre M106. Desde 1992 se realizaron estudios encaminados a su caracterización

morfológica e isoenzimática que permitieron conocer la variabilidad existente, identificar las repeticiones y clasificar los cultivares atendiendo a los principales orígenes de variabilidad. Las frecuencias alélicas correspondientes a 24 alelos encontrados en 10 *loci* permitieron agrupar 406 introducciones y 21 cultivares comerciales en 190 genotipos diferentes, lo que indica una elevada diversidad en el Banco de Germoplasma. De estos estudios, se seleccionaron 350 introducciones que son diferentes entre sí, de las cuales se presentan aquí sus Fichas Varietales y se recomienda su conservación en el Banco de Germoplasma para preservar la variabilidad. De ellas, se preseleccionaron 53 accesiones para posteriores ensayos comparativos. De 20 cultivares se disponía de descripciones previas y nuestros resultados mostraron coincidencias en 12.

**Palabras Clave:** Banco de Germoplasma, variabilidad, morfología, isoenzimas, clasificación.

## SUMMARY

In Spain there are three Germplasm Banks of local apple cultivars, localised in Aragón, Asturias and Galicia. Local cultivars were very important in the apple production in the past and, in recent years, in the production for cider. Galician Germplasm Bank of local cultivars of apple was established in the Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, A Coruña, between 1978 and 1981. This Bank includes at present 408 accessions from the four Galician provinces and they were grafted over M106 rootstock. From 1992, studies of morphological characterisation and of isoenzymes were realised to know the variability, to identify repetitions and classify the cultivars attending to the main origins of variability. Allelic frequencies corresponding to 24 alleles found in 10 *loci* allowed to group 406 accessions and 21 commercial cultivars in 190 different genotypes, which shows a high diversity in the Germplasm Bank. As result of these studies, 350 accessions were selected being different and we suggest their conservation in the Germplasm Bank to preserve the

variability. For 20 cultivars we had previous descriptions and our results showed coincidences in 12 of them.

**Key words:** Germplasm Bank, variability, morphology, isoenzymes, classification.

## INTRODUCCIÓN

El manzano cultivado en la actualidad es el resultado de una hibridación interespecífica y se ha aceptado el binomio *Malus xdomestica* como el nombre científico más apropiado (Lespinasse, 1992; Morgan y Richards, 1993; Janick *et al.*, 1996). Se considera como principal ancestro a *M. sieversii*, el cual se encuentra en forma salvaje en el oeste de China. Otras especies que han contribuido al actual manzano cultivado son: *M.orientalis*, *M. sylvestris*, *M.baccata* y *M.prunifolia.* La mayor parte de los manzanos cultivados son diploides funcionales (2n=34) (Janick *et al.*, 1996).

En el noroeste de España (Castroviejo, 1998), *Malus sylvestris* es espontáneo y *Malus xdomestica* debió ser introducido desde muy antiguo (Boré y Fleckinger, 1997). Es entonces posible que estas especies hayan hibridado, dando lugar a variedades nuevas, apenas comestibles, formando árboles más rústicos que los que se utilizan para el consumo de mesa.

La importancia y necesidad de la mejora del manzano han sido bien expresadas por Keulemans (1993): "la arboricultura frutal se sitúa en un contexto que evoluciona rápidamente: se demanda una mayor diversificación varietal, frutos de calidad (coloreados, firmes y jugosos), buena conservación y menos sensibles a la manipulación". En este ánimo, las selecciones tradicionales pueden aportar alguna novedad con una buena adaptación ecológica y la necesidad de menores tratamientos culturales.

La manzana es una de las frutas de mayor consumo y de mayor importancia en el comercio mundial, superada sólo por las naranjas y algunos años por los plátanos. En el año

1998, según la FAO (1999), la producción mundial superó los 57 millones de toneladas, siendo China el principal productor mundial, seguido a mucha distancia por Estados Unidos. Los principales productores europeos son Francia, Alemania e Italia, que superan los 2 millones de toneladas. En 1998 España produjo 719.000 t y ocupó el número quince en la lista mundial de productores. La producción española no llega a abastecer el consumo interno, durante 1998 las importaciones superaron a las exportaciones en 74.590 t.

Entre los años 1500 y 1850 aproximadamente, hay numerosas referencias de embarques de fruta gallega (con importante presencia de cítricos) con destino a Portugal, Francia, Holanda, Alemania o Inglaterra. A partir de la primera mitad del siglo XIX, la exportación gallega se fue sustituyendo paulatinamente por los suministros portugueses y levantinos (Meijide, 1961).

En tratados de fruticultura de principios de este siglo aún se reconoce a Galicia como principal productor nacional de manzana (Laffitte, 1918). Sin embargo, a partir del final de la década de los 50 y primeros 60, la situación cambia coincidiendo con el desarrollo de la fruticultura industrial, principalmente en Lleida. Herrero, en su CARTOGRAFÍA DE FRUTALES DE HUESO Y PEPITA (1964), señala al manzano como principal cultivo frutal en la zona (no incluye en su estudio a los frutos secos) e indica la falta de orientación comercial en las plantaciones, la división de la propiedad y, localmente, alguna limitación climática, como factores condicionantes de la falta de expansión del cultivo frutal.

Con la introducción de la fruticultura intensiva en Galicia a principios de la década de los 70, hay que distinguir entre el cultivo tradicional destinado a la elaboración de sidra y el cultivo industrial destinado a la manzana de mesa. Surge del impulso de las agencias de Extensión Agraria y, simultáneamente, de una iniciativa privada con un fuerte apoyo institucional y financiero, que lleva a crear en 1970 una sociedad denominada INDUCOA (Industria y Comercialización Agraria S.A.), dedicada a promover y gestionar plantaciones

frutales. En este momento se alcanzan las 1500 ha de cultivo de frutales de pepita, manzano fundamentalmente. Sin embargo, esta iniciativa empresarial fracasa y el sector entra en una profunda crisis, de la que aún hoy no se ha recuperado.

La localización geográfica del cultivo del manzano se circunscribe básicamente a 5 zonas: Betanzos en A Coruña, A Estrada-Ulla-Santiago entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, Chantada y Monforte en Lugo y O Barco en Ourense (Ascasíbar *et al.*, 1999). Esto da una idea de la dispersión de las explotaciones, lo que de entrada constituye un freno a los intentos de organización de la oferta.

Se considera que el mercado gallego, y el de todo el norte de España, muestra preferencia por las variedades ácidas y amarillas. Observando la composición varietal de las ventas correspondientes al total de encuestas realizadas por Ascasíbar *et al.* (1999), se puede corroborar esta afirmación: el 55,8% de las ventas de los encuestados corresponden a la variedad Golden, el 9,7% a 'Reineta del Canadá', a 'Granny-Smith' el 2,8%, a las Rojas y Bicolores modernas el 29,0% y al resto el 2,67%.

El origen de las manzanas comercializadas en Galicia es prioritariamente Cataluña, concretamente Lleida, citada como principal zona de abastecimiento en el 85% de los mayoristas que compra en origen, pero Girona adquiere importancia, sobre todo por la calidad de sus productos. Le sigue en importancia El Bierzo, que es citado en una proporción similar como segunda zona de compra. Otras zonas nombradas son la Ribera del Ebro (Rioja, Navarra, Aragón) y Badajoz.

*Bancos de germoplasma de manzano en España.*

Los últimos datos sobre recursos genéticos de manzano en España han sido recogidos por Dapena (1996). En España el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) tiene un programa para la conservación y uso de los recursos fitogenéticos (Orden del 23 de

Abril de 1993) que es coordinado por el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias). Este programa tiene como principales objetivos: i) La conservación y mantenimiento de la diversidad genética, y ii) La evaluación y documentación de este material, para facilitar su uso en los programas de Mejora Genética.

La estructura del Plan de Conservación de Recursos Genéticos es descentralizada, con Bancos de Germoplasma de diferentes especies localizados en las regiones donde estas especies están ampliamente extendidas. En manzano es la Cornisa Cantábrica y, en general el norte peninsular, donde se concentra la mayor diversidad genética de manzano cultivado. Cada Banco de Germoplasma es mantenido por la correspondiente comunidad autónoma y los programas centrados en los Recursos Fitogenéticos del INIA.

En España, los Bancos de Germoplasma de manzano son los siguientes:

1. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Villaviciosa, Asturias. Se mantienen 365 cultivares, de los que 207 son cultivares locales (148 asturianos y el resto del País Vasco) y 23 cultivares de sidra franceses e ingleses.

2. Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Mabegondo, A Coruña, Galicia. Se mantienen 408 introducciones correspondientes a las cuatro provincias gallegas (ver siguiente apartado).

3. Estación de Aula Dei, Zaragoza, Aragón. Se mantienen 109 cultivares de manzano, de los que 56 son cultivares locales.

La Diputación Foral de Vizcaya llevó también a cabo algunas prospecciones de material autóctono y de rescate de variedades en 1973, fruto de las cuales es la colección del Centro Hortofrutícola de Zalla, que consta de variedades de mesa autóctonas y 33 extranjeras (Cambra e Ibarz, 1975).

*El Banco de Germoplasma del CIAM (A Coruña) localizado en Guísamo.*

La iniciativa de realizar una colección de cultivares locales en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo correspondió a D. Manuel Ponte. D. Santiago Silvar y D. Jesús Tubío Ces realizaron la recogida e introducción del material en colección.

Entre los años 1978 y 1981 se recorrieron las cuatro provincias gallegas en las que se localizaron en distintas localidades cultivares autóctonos de manzano (Figura 1), peral, ciruelo, cerezo y melocotonero. El investigador encargado de esta colección viva es Juan Piñeiro Andión (Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Xunta de Galicia).

El Banco cuenta con material recogido en las siguientes fechas: 1978 en la provincia de A Coruña, 1979 en Pontevedra, 1980 en Lugo y 1981 en Ourense (Figura 1). El total de entradas registradas por especies es de: 408 de manzano, 246 de peral, 23 cerezos, 54 ciruelos, y 31 melocotoneros.

Para el establecimiento del Banco de Germoplasma se injertaron las introducciones sobre M106 en el caso de manzano, dos plantas se formaron en sistema Lepage y dos en vaso. De esta colección sólo se realizó toma de datos de fenología entre los años 1979 y 1983 y no fue completada para todas las introducciones hasta los años 1996-1998.

De las introducciones de manzano existentes en el Banco de Germoplasma del CIAM, el cultivar Camuesa fue referenciado por Laffitte en 1918, los cultivares Reineta, Repinaldo y Tabardilla lo fueron por Laffitte en 1920, las variedades Hocico de Liebre por Guinea en 1957 y en la CARTOGRAFÍA DE FRUTALES DE HUESO Y PEPITA (1964) aparecen descripciones de 20 cultivares gallegos.

La caracterización varietal es el primer paso en el conocimiento del material autóctono para comprobar si alguna variedad puede ser de interés para su utilización inmediata en la producción industrial. En el caso de que ninguna reúna todas las características exigidas a una

variedad moderna, podrán al menos seleccionarse parentales que aporten determinadas características interesantes, como resistencia a enfermedades.

En el Reglamento (CE) Nº 1467/94 del Consejo de 20 de junio de 1994 relativo a la "Conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario", se recomienda la conservación de los recursos genéticos animales y vegetales, para lo cual se sugieren una serie de fases, la segunda de las cuales hace referencia a la caracterización de las colecciones: "Se creará la base de datos. Se reunirán los datos de pasaporte, se multiplicará o regenerará el material y se caracterizarán los descriptores primarios".

En 1992 se obtuvo financiación para comenzar el estudio de los cultivares de manzano autóctonos, que en principio eran los que suscitaban mayor interés en la comunidad frutícola gallega. El proyecto financiado se denominó "Caracterización agronómica, isoenzimática y resistencia a enfermedades de variedades autóctonas gallegas de manzano", XUGA 29106A94 (DOG12/1/95), XUNTA DE GALICIA, años 1995-96. Posteriormente, se consiguió financiación para terminar el proyecto dentro del Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos del MAPA, RF99-019-C2-2, años 1999-2002, con el título "Colección de cultivares gallegos recogidos en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo: Caracterización".

En este trabajo se presentan las fichas varietales correspondientes a las introducciones de manzano realizadas en el Banco de Germoplasma de Mabegondo, clasificadas por su interés una vez conocidas sus sinonimias.




Figura 1. Áreas de muestreo y recolección de muestras de manzano para el Banco de Germoplasma de Mabegondo: 1, Noia; 2, Negreira; 3, Carballo; 4, Cambre; 5, Oleiros; 6, Sada; 7, Bergondo; 8, Abegondo; 9, Oza Dos Rios; 10, Vilarmaior; 11, Pontedeume; 12, Cabanas; 13, Fene; 14, Ferrol; 15, Cariño; 16, Ortigueira; 17, Mañon; 18, Viveiro; 19, Alfoz; 20, Mondoñedo; 21, Riotorto; 22, A Pontenova; 23, A Fonsagrada; 24, Navia De Suarna; 25, Becerreá; 26, O Corgo; 27, Lugo; 28, Guitiriz; 29, Chantada; 30, Sarria; 31, Pobra De Brollon; 32, Monforte De Lemos; 33, Ribas De Sil; 34, A Rua; 35, O Barco; 36, Viana Do Bolo; 37, Baltar; 38, Bande; 39, Celanova; 40, Allariz; 41, Baños De Molgas; 42, Maceda; 43, Vilamarin; 44, O Carballiño; 45, Leiro; 46, Beade; 47, As Neves; 48, Ponteareas; 49, O Rosal; 50, Redondela; 51, Ponte Caldelas; 52, Pontevedra; 53, Marin; 54, Moaña; 55, Meaño; 56, Ribadumia; 57, Portas; 58, Vilagarcia De Arousa; 59, Forcarei; 60, Lalin; 61, Silleda; 62, A Estrada; 63, Padrón; 64, Teo; 65, Dodro.

# MATERIAL Y MÉTODOS

## Material Vegetal

El material objeto de estudio son 408 cultivares de manzano gallegos recogidos en el Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Xunta de Galicia, localizado en Mabegondo, A Coruña (Tabla 1).

**Tabla 1. Árboles estudiados.**

| Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roja De Julio | A Coruña | 40 | Blanca Estriada | A Coruña | 79 | Parecida Jose Antoni | A Coruña |
| 2 | Blanca S.Juan | A Coruña | 41 | Camoesa | A Coruña | 80 | Blanca | A Coruña |
| 3 | Desconocida | A Coruña | 42 | De Principe | A Coruña | 81 | Peros Camba | Pontevedra |
| 4 | Ollo Landoy | A Coruña | 43 | Morenas | A Coruña | 82 | Camba | Pontevedra |
| 5 | Peros Do Can | A Coruña | 44 | Asturias | A Coruña | 83 | Pequeña Verde | A Coruña |
| 6 | Marafouza | A Coruña | 45 | Tres En Cunca | A Coruña | 84 | Sangre De Toro | A Coruña |
| 7 | Allo Mouro | A Coruña | 46 | Cobadia | A Coruña | 85 | Tres En Cunca | A Coruña |
| 8 | Ardio | A Coruña | 47 | Santa Maria | A Coruña | 86 | Platano | A Coruña |
| 9 | Parafreir (Suiza) | A Coruña | 48 | Grande Plana | A Coruña | 87 | Tarde | A Coruña |
| 10 | Francesa Muy Grande | A Coruña | 49 | Santiaguesa | A Coruña | 88 | Tabardilla Romana | A Coruña |
| 11 | Repinaldo Octubre | A Coruña | 50 | Manzana De Julio | A Coruña | 89 | Camoesa Dulce Septie | A Coruña |
| 12 | Grande Plana | A Coruña | 51 | Tabardilla Parda | A Coruña | 90 | Roja De Julio | A Coruña |
| 13 | Dulce | A Coruña | 52 | Blanca Plana | A Coruña | 91 | Desconocida | A Coruña |
| 14 | Comadronas | A Coruña | 53 | De Fraga | A Coruña | 92 | Blanca De Julio | A Coruña |
| 15 | Reineta | A Coruña | 54 | Cunqueira | A Coruña | 93 | Roja Estriada | A Coruña |
| 16 | Temprana | A Coruña | 55 | Tabardilla Tardia | A Coruña | 94 | Reinetas | A Coruña |
| 17 | Jose Antonio | A Coruña | 56 | Muy Grande | Lugo | 95 | Repinaldo | A Coruña |
| 18 | Grande Dulce | A Coruña | 57 | Blancas | A Coruña | 96 | Principe Grande | A Coruña |
| 19 | Tres En Cunca | A Coruña | 58 | Tres En Cunca Muy Gr | Lugo | 97 | Temprana | A Coruña |
| 20 | Blanca De Julio | A Coruña | 59 | Manzana De Sada | A Coruña | 98 | Temprana | A Coruña |
| 21 | Tabardilla Francesa | A Coruña | 60 | Amarillas | A Coruña | 99 | Verdosa Temprana | Lugo |
| 22 | Tres En Cunca Y Otra | A Coruña | 61 | Santiaguesas | A Coruña | 100 | Verdosa Septiembre | Lugo |
| 23 | Fariñentas | A Coruña | 62 | Muy Grande Aplanada | A Coruña | 101 | Pontellas | A Coruña |
| 24 | Grande Plana Verde | A Coruña | 63 | Tabardilla Plana Est | A Coruña | 102 | Blancas 2ª Julio | A Coruña |
| 25 | Grandisima Amarilla | A Coruña | 64 | Temprana De Julio | A Coruña | 103 | Desconocida | A Coruña |
| 26 | Julio-Septiembre | A Coruña | 65 | Manzana De Invierno | A Coruña | 104 | De Julio | A Coruña |
| 27 | Tardia De Marzo | A Coruña | 66 | Tabardilla Roja | A Coruña | 105 | Desconocida | A Coruña |
| 28 | De Cera Agosto | A Coruña | 67 | Repinaldo Rojo | A Coruña | 106 | Repinaldo | A Coruña |
| 29 | Camoesa Fina | A Coruña | 68 | Reineta | A Coruña | 107 | Rayas | A Coruña |
| 30 | Tabardilla Francesa | A Coruña | 69 | Blanca Cerosa | A Coruña | 108 | Negras | A Coruña |
| 31 | Jose Antonio | A Coruña | 70 | Pero Mingan | A Coruña | 109 | Rojas | A Coruña |
| 32 | De Mayo Blanca | A Coruña | 71 | Grande Plana Estriad | A Coruña | 110 | Desconocida | A Coruña |
| 33 | Maza Fresca | A Coruña | 72 | Sangre De Toro | A Coruña | 111 | Troncoconicas | A Coruña |
| 34 | De Pera | A Coruña | 73 | Blanca Rojo | A Coruña | 112 | Tres En Cunca | A Coruña |
| 35 | Roja De Julio | A Coruña | 74 | Tabardilla Blanca | A Coruña | 113 | Blandas Rayas | A Coruña |
| 36 | Rogelia | A Coruña | 75 | Repinaldo Branca | A Coruña | 114 | Repinaldo Septiembre | A Coruña |
| 37 | Romana | A Coruña | 76 | 3º Premio "76" | A Coruña | 115 | Tardias | A Coruña |
| 38 | Jose Antonio | A Coruña | 77 | Arriscadas | A Coruña | 116 | Agosto | A Coruña |
| 39 | Pero Canela | A Coruña | 78 | Cascuda | A Coruña | 117 | T.Blanca | A Coruña |

**Tabla 1 (Continuación). Árboles estudiados.**

| Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Peros | A Coruña | 176 | Peiro | A Coruña | 234 | Faba | Pontevedra |
| 119 | Peraza | A Coruña | 177 | Esperiega Ademuz | A Coruña | 235 | Desconocida | Pontevedra |
| 120 | Desconocida | A Coruña | 178 | Tabardilla Real | A Coruña | 236 | Pero | Pontevedra |
| 121 | Temprana | A Coruña | 179 | Desconocida | A Coruña | 237 | Desconocida | Pontevedra |
| 122 | Pedra Dura | A Coruña | 180 | Desconocida | A Coruña | 238 | De Invierno | Pontevedra |
| 123 | Desconocida | A Coruña | 181 | Tabardilla | A Coruña | 239 | Santa Maria | Pontevedra |
| 124 | Ollo Blanco | A Coruña | 182 | Rabala | A Coruña | 240 | Desconocida | Pontevedra |
| 125 | Temprana Blanca | A Coruña | 183 | Desconocida | A Coruña | 241 | Desconocida | Pontevedra |
| 126 | Parecida Jose Antoni | A Coruña | 184 | Parecida De Cera | A Coruña | 242 | Amarilla Julio | Pontevedra |
| 127 | Roja | A Coruña | 185 | Do Cu Negro | A Coruña | 243 | Reineta | Pontevedra |
| 128 | De S.Juan Roja | A Coruña | 186 | Desconocida | A Coruña | 244 | De S.Juan Roja | Pontevedra |
| 129 | Pero | A Coruña | 187 | Tabardilla Blanca | A Coruña | 245 | Do Apostol | Pontevedra |
| 130 | Maza Dura | A Coruña | 188 | Desconocida | A Coruña | 246 | Desconocida | Pontevedra |
| 131 | Desconocida | A Coruña | 189 | Desconocida | A Coruña | 247 | Desconocida | Pontevedra |
| 132 | De Agosto | A Coruña | 190 | De Canle | A Coruña | 248 | Pata De Mula | Pontevedra |
| 133 | Desconocida | A Coruña | 191 | Parecida De Cera | A Coruña | 249 | Cafe | Pontevedra |
| 134 | Castellana | A Coruña | 192 | Tabardilla Parda | Lugo | 250 | Louriñan | Pontevedra |
| 135 | Santiaguesa | A Coruña | 193 | Tabardilla Blanca | Lugo | 251 | Xaneira | Pontevedra |
| 136 | Desconocida | A Coruña | 194 | Verdellas | A Coruña | 252 | Reineta | Pontevedra |
| 137 | Desconocida | A Coruña | 195 | Duras | A Coruña | 253 | Repinaldo | Pontevedra |
| 138 | Desconocida | A Coruña | 196 | Parecida De Cera | Pontevedra | 254 | Vizcaiña | Pontevedra |
| 139 | Repinaldo | A Coruña | 197 | Desconocida | Pontevedra | 255 | Desconocida | Pontevedra |
| 140 | Desconocida | A Coruña | 198 | Parecida Repinaldo | Pontevedra | 256 | Toca Pandeiro | Pontevedra |
| 141 | De Rayas | A Coruña | 199 | Folla | Pontevedra | 257 | Roja De Verano | Pontevedra |
| 142 | Desconocida | A Coruña | 200 | Rayada De Asturias | Pontevedra | 258 | Roja De Verano | Pontevedra |
| 143 | De Julio | A Coruña | 201 | Negras | Pontevedra | 259 | De Puebla | Desconocido |
| 144 | Desconocida | A Coruña | 202 | Tardia De Octubre | Pontevedra | 260 | Desconocida | Pontevedra |
| 145 | Pero Dulce | A Coruña | 203 | San Lorenzo | Pontevedra | 261 | Desconocida | Pontevedra |
| 146 | Desconocida | A Coruña | 204 | Sanjuanera Roja | Pontevedra | 262 | Desconocida | Pontevedra |
| 147 | Tabardilla Blanca | A Coruña | 205 | Tres En Rama | Pontevedra | 263 | Golden Gallega | Pontevedra |
| 148 | Temprana | A Coruña | 206 | Desconocida | Pontevedra | 264 | Camoesa | Pontevedra |
| 149 | Desconocida | A Coruña | 207 | Mariñas | Pontevedra | 265 | De S.Juan | Pontevedra |
| 150 | Desconocida | A Coruña | 208 | Desconocida | Pontevedra | 266 | Parda | Pontevedra |
| 151 | De Invierno | A Coruña | 209 | Desconocida | Pontevedra | 267 | Desconocida | Pontevedra |
| 152 | Desconocida | A Coruña | 210 | Morro De Liebre | Pontevedra | 268 | Desconocida | Pontevedra |
| 153 | Desconocida | A Coruña | 211 | Santa Maria | Pontevedra | 269 | Desconocida | Pontevedra |
| 154 | De Libra | A Coruña | 212 | Desconocida | Pontevedra | 270 | Desconocida | Pontevedra |
| 155 | De Noya | A Coruña | 213 | Tabardilla | Pontevedra | 271 | Desconocida | Pontevedra |
| 156 | Blanca Plana | A Coruña | 214 | De Cedo | Pontevedra | 272 | Desconocida | Pontevedra |
| 157 | Roja Muy Fuerte | A Coruña | 215 | Desconocida | Pontevedra | 273 | Desconocida | Pontevedra |
| 158 | Desconocida | A Coruña | 216 | Do Prado Da Cima | Pontevedra | 274 | Desconocida | Pontevedra |
| 159 | Parecida Tabardilla | A Coruña | 217 | Fariñentas | Pontevedra | 275 | Desconocida | Pontevedra |
| 160 | Desconocida | A Coruña | 218 | Camoesa Dulce | Pontevedra | 276 | Desconocida | Pontevedra |
| 161 | Desconocida | A Coruña | 219 | Pero Dulce | Pontevedra | 277 | Espleje | Pontevedra |
| 162 | Mediana Agosto | A Coruña | 220 | Pero Repinaldo | Pontevedra | 278 | Paxeta | Pontevedra |
| 163 | De Agosto | A Coruña | 221 | Redondela | Pontevedra | 279 | Cregueira | Pontevedra |
| 164 | Tabardilla Parda | A Coruña | 222 | Desconocida | Pontevedra | 280 | Caguleira O Presente | Pontevedra |
| 165 | De Septiembre | A Coruña | 223 | Freixeirana | Pontevedra | 281 | Parece "Cox" | Pontevedra |
| 166 | Parecida Tabardilla | A Coruña | 224 | Reineta Blanca | Pontevedra | 282 | Albariña | Pontevedra |
| 167 | De Agosto | A Coruña | 225 | Pimienta | Pontevedra | 283 | Desconocida | Pontevedra |
| 168 | Desconocida | A Coruña | 226 | De Rioboi | Pontevedra | 284 | San Antonio | Pontevedra |
| 169 | Desconocida | A Coruña | 227 | Tabardilla Real | Pontevedra | 285 | Piolla | Pontevedra |
| 170 | Roja Plana | A Coruña | 228 | Tabardilla Parda | Pontevedra | 286 | Riscadas | Pontevedra |
| 171 | Desconocida | A Coruña | 229 | Tardia | Pontevedra | 287 | Riscadas | Pontevedra |
| 172 | Cacharela O Tres En | A Coruña | 230 | Temprana | Pontevedra | 288 | Desconocida | Pontevedra |
| 173 | Muleiriña | A Coruña | 231 | Tres En Cunca | Pontevedra | 289 | Luneda | Pontevedra |
| 174 | Tabardilla | A Coruña | 232 | Desconocida | Pontevedra | 290 | Costoya | Pontevedra |
| 175 | Tabardilla Antigua | A Coruña | 233 | Bico Negro | Pontevedra | 291 | Altonobles | Pontevedra |

**Tabla 1 (Continuación). Árboles estudiados.**

| Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen | Nº. | Denominación | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Dulce | Pontevedra | 345 | Rubia | Lugo | 397 | Ros Redonda | Ourense |
| 293 | Dos Enfermos | Pontevedra | 346 | Desconocida | Lugo | 398 | Desconocida | Ourense |
| 294 | Maza De Todo O Ano | Pontevedra | 347 | Bilbaina | Lugo | 399 | Desconocida | Ourense |
| 295 | Desconocida | Pontevedra | 348 | Temprana | Lugo | 400 | Desconocida | Ourense |
| 296 | Desconocida | Pontevedra | 349 | De Invierno | Lugo | 401 | Desconocida | Ourense |
| 297 | Desconocida | Pontevedra | 350 | Do Pais O Perdices | Lugo | 402 | Desconocida | Ourense |
| 298 | Parecida A Golden | Pontevedra | 351 | Desconocida | Lugo | 403 | Parecida Golden | Ourense |
| 299 | Desconocida | Pontevedra | 352 | Desconocida | Lugo | 404 | Parecida G.Smith | Ourense |
| 300 | Blanca | Pontevedra | 353 | Desconocida | Lugo | 405 | Desconocida | Ourense |
| 301 | De Pataca | Lugo | 354 | Desconocida | Lugo | 406 | Desconocida | Ourense |
| 302 | De Septiembre | Lugo | 355 | Parecida De Cera | Lugo | 407 | E1 | Desconocido |
| 303 | Desconocida | Lugo | 356 | Desconocida | Lugo | 408 | E2 | Desconocido |
| 304 | Repinaldo | Lugo | 357 | R.De Reinetas | Lugo | 1001 | Bella Boskoop | Vivero |
| 305 | Parecida R.Encarnada | Lugo | 358 | Belarda Blanca | Lugo | 1002 | Buluaga | Vivero |
| 306 | Desconocida | Lugo | 359 | Belarda Roja | Lugo | 1003 | Early Red One | Vivero |
| 307 | Desconocida | Lugo | 360 | Peros Blancos | Lugo | 1004 | Gala | Vivero |
| 308 | Desconocida | Lugo | 361 | Tabardilla | Lugo | 1005 | Gala Imperial | Vivero |
| 309 | Tardia | Lugo | 362 | Desconocida | Lugo | 1006 | Gloster | Vivero |
| 310 | Verde Helada O Glase | Lugo | 363 | Desconocida | Lugo | 1007 | Golden | Vivero |
| 311 | Tardia | Lugo | 364 | De S.Roque | Lugo | 1008 | Granny Smith | Vivero |
| 312 | Ramona | Lugo | 365 | Coruñesa | Lugo | 1009 | Red Chief | Vivero |
| 313 | Desconocida | Lugo | 366 | Sangre De Toro | Lugo | 1010 | Reina De Reinetas | Vivero |
| 314 | Desconocida | Lugo | 367 | Desconocida | Lugo | 1011 | Reineta Blanca | Vivero |
| 315 | Desconocida | Lugo | 368 | Desconocida | Lugo | 1012 | Reineta De Caux | Vivero |
| 316 | Desconocida | Lugo | 369 | Temprana | Lugo | 1013 | Reineta Gris | Vivero |
| 317 | Dulce Septiembre | Lugo | 370 | Desconocida | Ourense | 1014 | Tabardilla | Vivero |
| 318 | Pero De Invierno | Lugo | 371 | Desconocida | Ourense | 1015 | Teorica | Vivero |
| 319 | Desconocida | Lugo | 372 | Mandarina | Ourense | 1016 | Cardinal | Vivero |
| 320 | Desconocida | Lugo | 373 | Sangre De Toro | Ourense | 1017 | Cooper | Vivero |
| 321 | Bella Colorada | Lugo | 374 | Desconocida | Ourense | 1018 | Erovan | Vivero |
| 322 | Ferroi | Lugo | 375 | Rabal | Ourense | 1019 | Golden 4187 | Vivero |
| 323 | Leuros | Lugo | 376.1 | Desconocida | Ourense | 1020 | M106 | Vivero |
| 324 | Desconocida | Lugo | 376.2 | Desconocida | Ourense | 1021 | M9 | Vivero |
| 325 | Peros | Lugo | 377 | Desconocida | Ourense | 1022 | Mcintosh | Vivero |
| 326 | De Septiembre | Lugo | 378 | Desconocida | Ourense | 1023 | Oregón | Vivero |
| 327 | Tempera | Lugo | 379 | Desconocida | Ourense | 1024 | Ozark Gold | Vivero |
| 328 | Desconocida | Lugo | 380 | Desconocida | Ourense | 1025 | Peas Good | Vivero |
| 329 | Coro | Lugo | 381 | Desconocida | Ourense | 1026 | Red Gala | Vivero |
| 330 | Desconocida | Lugo | 382 | Desconocida | Ourense | 1027 | Red Spur | Vivero |
| 331 | Desconocida | Lugo | 383 | Desconocida | Ourense | 1028 | Reineta Encarnada | Vivero |
| 332 | Parecida Starking | Lugo | 384 | Desconocida | Ourense | 1029 | Reineta Regil | Vivero |
| 333 | Parecida Carapanon | Lugo | 385 | Desconocida | Ourense | 1030 | Summer Red | Vivero |
| 334 | Reineta | Lugo | 386 | Desconocida | Ourense | 1031 | Top Red | Vivero |
| 335 | Regalada | Lugo | 387 | Desconocida | Ourense | 1032 | Transparente Blanca | Vivero |
| 336 | Desconocida | Lugo | 388 | Desconocida | Ourense | | | |
| 337 | Desconocida | Lugo | 389 | Santa Marta | Ourense | | | |
| 338 | Espiño Mol | Lugo | 390 | Desconocida | Ourense | | | |
| 339 | Maza De Pera | Lugo | 391 | Desconocida | Ourense | | | |
| 340 | Piel De Sapo | Lugo | 392 | Desconocida | Ourense | | | |
| 341 | Dulce | Lugo | 393 | Desconocida | Ourense | | | |
| 342 | Desconocida | Lugo | 394 | Desconocida | Ourense | | | |
| 343 | Desconocida | Lugo | 395 | Ros Alargada | Ourense | | | |
| 344 | Tabardilla | Lugo | 396 | Gravillan | Ourense | | | |

Banco de Germoplasma del CIAM, del 1 al 408. Cultivares comerciales adquiridos en vivero, del 1001 al 1032.

**Isoenzimas**

El análisis isoenzimático de los cultivares estudiados incluidos en este trabajo ha sido puesto a punto previamente para castaño a partir de la metodología existente en el laboratorio de Electroforesis del Centro de Investigación Agraria de Cabrils (Barcelona) primero y en el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán después por Fernández (1992) y Pereira (1994). Los sistemas estudiados han sido dos en almidón, Fosfoglucoisomerasa (PGI), E.C.5.3.1.9, y Fosfoglucomutasa (PGM), E.C.2.7.5.1, y uno en acrilamida, Esterasa (EST), E.C.3.1.1. Estos sistemas fueron previamente estudiados por Manganaris (1989), Manganaris y Alston (1992), Batlle (1993) y Pereira (1994).

Las frecuencias alélicas correspondientes a los sistemas enzimáticos PGM y EST se han calculado basándose en los loci asignados por Manganaris (1989), menos en el caso de Pgm-1, donde una mayor variabilidad encontrada en nuestra población de cultivares nos llevó a la asignación de cuatro alelos (Ascasíbar, 2000). En el caso de PGI se han considerado cuatro loci según la designación realizada por Ascasíbar (2000). Esta asignación de alelos ha permitido el cálculo de las frecuencias alélicas para cada individuo.

Las frecuencias alélicas nos permitieron confirmar la elevada variabilidad intra e intercultivar encontrada mediante caracteres morfológicos e isoenzimáticos (Ascasíbar, 2000). Asimismo estas frecuencias alélicas permitieron definir las sinonimias existentes y complementar la información obtenida con caracteres morfológicos.

**Fichas varietales**

En un trabajo previo (Ascasíbar, 2000) se estudiaron en la colección 89 descriptores descritos por la UPOV (1974) e IBPGR según Watkins y Smith (1983) como más interesantes para el estudio de cultivares de manzano. Estos descriptores se desglosaron en 279 variables. El análisis de estas variables mediante el ANOVA, permitió el cálculo de la heredabilidad

para la características cuantitativas, y el análisis multivariante, Análisis de Componentes Principales y Análisis Cluster, detectaron seis orígenes de discriminación que permitieron agrupar los individuos estudiados en 42 grupos atendiendo a: i) tamaño del fruto, ii) color, iii) acidez, iv) dulzor, v) época de recolección y vi) atractivo del fruto (Ascasíbar, 2000). Como resumen de este trabajo, se han elaborado fichas varietales para cada clon a partir de los valores medios de los descriptores cuantitativos y de los valores más frecuentes de los descriptores cualitativos.

Las fichas descriptivas se ha dividido en 6 apartados. El primero referido a la denominación y procedencia, el segundo a la fenología, el tercero a la descripción morfológica del fruto, el cuarto a la descripción de hoja, el quinto a la flor y el sexto a la intensidad de los ataques de plagas y enfermedades observada en el Banco de Germoplasma. Cada ficha se ilustra con una fotografía de los frutos, desde la Fig. 2 a la 58.

Para la agrupación en clases de los caracteres cuantitativos se han empleado los percentiles correspondientes al 25 y 75%, lo que permite dividir cada uno de ellos en 3 clases.

Las fichas descriptivas se han clasificado en dos grupos. En el primero se recogen los 53 clones que se propone pre-seleccionar para su estudio agronómico (Ascasíbar, 2000). El segundo recoge el resto de los árboles de la colección, 297, que se conservarán en el Banco de Germoplasma por suponer una variante respecto a las preselecciones.

**Modelo de ficha varietal**

**PROCEDENCIA**

**Número de identificación en la colección:** Desde el 1 al 406 y E1 y E2 a excepción de los números 2, 180, 315 y 316, que no se corresponden con ninguna muestra.

**Denominación**: Nombre facilitado por el agricultor al efectuar la prospección. Si no se conoce se indica “desconocida”.

**Procedencia:** Localidad, Municipio y Provincia donde se recolectó la púa para realizar el injerto. Se indican altitud, latitud y longitud del lugar tomados de mapas topográficos del ejército a escala 1:50.000.

## FENOLOGÍA

Para caracterizar los estados fenológicos se empleó la clasificación de Fleckinger (1964). La toma de datos se efectuó 2 días a la semana hasta el estado J (fruto cuajado y en crecimiento), anotándose para cada accesión el estado más frecuente, el más avanzado y el más retrasado.

Se disponía de datos tomados en los años iniciales de la plantación, entre 1979-1983. Estos datos eran incompletos debido a que la plantación se realizó escalonadamente a lo largo de varios años y no todos los clones habían entrado en producción cuando se abandonó este trabajo. Por este motivo, y a fin de contar con al menos 2 repeticiones de cada clon, se completaron entre los años 1996-1998 las observaciones para los clones que no disponían de ellas.

Se aporta para cada individuo la fecha media de los estados fenológicos señalados a continuación:

**Brotación (Estado C3).** Estado fenológico de yema hinchada.

**Floración** (Estado F2). Plena floración.

**Recolección.** Fecha de recogida del fruto.

## CARACTERES DEL FRUTO

Para las observaciones del fruto se recogieron al menos 20 manzanas no terminales de dos árboles distintos, de las que se seleccionaron 10 que se consideraron representativas, para realizar las mediciones. Los parámetros recogidos en la ficha son los siguientes:

**Color.** Color de base del fruto: 1, Amarillo; 2, Verde; 3, Bicolor; 4, Roja; 5, Ocre.

**Chapa.** Tipo e intensidad de la chapa:

**Intensidad de la chapa:** 1, sin chapa; 2, fuerte; 3, media; 4, pálida.

**Tipo de chapa**: 1, a rayas; 2, a manchas; 3, salpicada; 4, lavada; 5, completa.

**Forma:** Forma del fruto (UPOV, 1974): 1, globosa; 2, globoso-cónica; 3, oblongo-truncada; 4, plana; 5, plana-globosa; 6, cónica; 7, intermedia-cónica; 8, elíptica; 9, elíptico-cónica; 10, oblonga; 11, oblongo-cónica.

**Tamaño:** En función del peso del fruto en gramos: pequeño, ≤ 79; medio, >79 y ≤ 134; grande, > 134.

**Epidermis**:

**Textura:** ahoyada, desigual, rugosa y suave.

**Presencia de pruina:** con o sin pruina.

**Presencia de cera:** nula, débil, elevada y media.

**Sensibilidad al russeting,** según el porcentaje de la epidermis cubierta de russeting: muy poco sensible ≤ 25 %, 25-37 %, poco sensible, 37-62 % medianamente sensible, 62-87 % sensible y >87 % muy sensible.

**Tamaño de las lenticelas:** grandes, medianas, y pequeñas.

**Disposición de los sépalos y de su base** (UPOV, 1974):

**Disposición:** 1: Planos convergentes, 2: Erectos convergentes, 3: Erectos, 4: Parcialmente replegados, 5: Completamente replegados.

**Base de los sépalos:** En contacto, libres, superpuestos.

**Fosa calicina:**

**Profundidad:** medida en mm; "poco profunda" ≤ 6,12; "profunda" >6,12 y ≤8,71"; "muy profunda">8,71

**Anchura:** medida en mm; “estrecha”, ≤20,44; “media”, >3,34 y ≤26,63; “ancha”,> 26,63

**Pedúnculo**:

**Grosor:** medido en mm; “estrecho”, ≤2,47; “medio”, >2,47 y ≤3,34; “grueso”, >3,34

**Longitud:** medida en mm; “corto”, ≤ 10,28; “medio”, >10,28 y ≤14,99; “largo”, >14,99

**Cavidad peduncular:**

**Profundidad:** medida en mm; “poco profunda” ≤ 9,14; “media” >9,14 y ≤12,17; “profunda”>12,17

**Anchura:** medida en mm; “estrecha”, ≤22,36; “media”, >22,36, y ≤27,99; “ancha”, >27,99

**Color de la pulpa** (UPOV, 1974): Amarilla, blanca, crema, verde, rosado.

**Firmeza de la pulpa:** Suave, intermedia, firme.

**Textura de la pulpa** (UPOV, 1974): Crocante, intermedia, harinosa.

**Jugosidad:** jugosa, intermedia, seca

**Sabor** (UPOV, 1974):

**Dulzor:** débil, media, alta

**Acidez:** ausente, débil, media, alta

**Aroma:** según la clasificación UPOV (1974): aromática, poco aroma, anisado

## CARACTERES DE LA HOJA

Los datos se tomaron sobre 10 hojas recogidas en un herbario realizado con hojas completamente desarrolladas, que ocupan de la 4ª a la 6ª posición en el ramo, recolectadas entre agosto y septiembre de 1996. La toma de muestras se completó en el verano de 1997. Los descriptores empleados fueron:

**Longitud.** Máxima longitud del limbo (sin peciolo) medida en mm: "corta" ≤ 69,57; "media" >69,57 y ≤82,3; "larga", >82,3.

**Anchura.** Máxima anchura del limbo de la hoja, medida en mm: "estrecha", ≤50,25; "media", >50,25 y ≤60,91; "ancha", >60,91.

**Longitud de las estípulas.** Máxima longitud de las estípulas, medida en mm: "corta" ≤ 7,47; "media" >7,47 y ≤10,22; "larga", >10,22.

**Anchura de las estípulas.** Máxima anchura de las estípulas, medida en mm: "estrecha", ≤1,3; "media", >1,3 y ≤1,99; "ancha", >1,99.

**Margen del limbo.** Forma según la denticulación del borde de la hoja, según la clasificación UPOV (1974): 1, ondulado; 2, biondulado; 3, serrado; 4, biserrado.

**Forma del ápice del limbo.** Según la clasificación UPOV (1974): 1, agudo. 2, acuminado. 3, cuspidado o muy acuminado. 4, mucronado.

**Forma de la base del limbo.** Según la clasificación UPOV (1974): 1, agudo. 2, obtuso. 3, redondeado. 4, cordiforme.

**Presencia de subestípulas:** presentes, ausentes.

## CARACTERES DE LA FLOR

Al igual que en el caso de la hoja las mediciones se realizaron en un herbario realizado en 1997. Se utilizaron 10 flores con su pedicelo, que correspondían a la 2ª o 3ª flor de la inflorescencia, recogidas cuando se encontraban completamente abiertas. Los datos que aparecen en las fichas son:

**Longitud de los pétalos.** Longitud total del segundo pétalo más largo de la flor, incluida la base medida en mm: "corta" ≤ 15,53; "media" >15,53 y ≤18,78; "larga", >18,78.

**Anchura de los pétalos.** Anchura del segundo pétalo más largo de la flor, en el punto más ancho medida en mm: "estrecha" ≤ 10,21; "media" >10,21 y ≤13,65; "ancha", >13,65.

**Margen de los pétalos.** Disposición de los pétalos entre sí según la clasificación UPOV (1974): 1, en contacto. 2, libres. 3, superpuestos.

**Longitud del pedicelo.** Medida en mm: "corta" ≤ 11,79; "media" >11,79 y ≤17,71; "larga", >17,71.

## PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Intensidad de los ataques observados de las plagas y enfermedades más importantes: según la clave: 0 "no presenta"; 1 "ataque débil"; 2 "ataque medio"; 3 "ataque fuerte". Las observaciones se realizaron durante cinco años directamente sobre los árboles, menos en el caso del moteado, en el que se han considerado también los ataques al fruto, y se ha calculado la media.

Las enfermedades y plagas estudiadas han sido: **Oidio** (*Podosphaera leucotricha* [Ell. & Ev.] Salm), **Moteado** (*Venturia inaequalis* (Cke.) Wint.), **Momificado** (*Monilia fructigena* Honey), **Pulgón lanígero** (*Eriosoma lanigerum* Hausm.), **Araña roja** *(Panonychus ulmi* Koch), **Chancro** (*Nectria galligena* Bres.). Al mismo tiempo se hizo un seguimiento de la presencia de **Raíces aéreas** (burrknots) con una misma gradación señalada para las plagas y enfermedades.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las frecuencias alélicas correspondientes a 24 alelos encontrados en 10 *loci* han permitido clasificar los 406 individuos de la colección y 21 cultivares comerciales en 190 genotipos diferentes (Tabla 2), lo que indica que el Banco de Germoplasma de Mabegondo recoge una elevada diversidad. El individuo codificado como 376 fue desdoblado en 376.1 y 376.2 puesto que los dos árboles incluidos en la colección presentaron perfiles isoenzimáticos diferentes. 112 accesiones mostraron perfiles singulares, mientras que el *cluster* 2, el perfil

isoenzimático más frecuente, lo presentaron un total de 25 accesiones, un 6 % de la colección (CISO 2, Tabla 2). Los grupos isoenzimáticos con la misma composición alélica no significaron ser sinonimias o repeticiones en todos los casos, como se ha demostrado en trabajos previos (Ascasíbar, 2000), sino sólo aquellos que presentaban también las mismas características morfológicas. Con ayuda de la estadística multivariante se ha podido proponer un sistema de clasificación de los individuos estudiados basado en caracteres morfológicos mediante seis caracteres discriminantes y complementada con la información isoenzimática (frecuencias alélicas) que han permitido definir las sinonimias existentes (Ascasíbar, 2000). En la Tabla 2 se muestran en negrita los individuos que presentaron diferencias morfológicas y que se propone que se sigan conservando en el Banco de Germoplasma de Mabegondo. De estos individuos presentamos posteriormente su ficha varietal, suponiendo que el resto, al coincidir sus características morfológicas y su perfil isoenzimático, se trata de repeticiones que deben eliminarse del Banco de Germoplasma.

Gran parte del material descrito en el presente trabajo es novedoso puesto que no ha sido descrito en trabajos previos y se desconocía su existencia, habiéndose comprobado que no se trata de copias de los principales cultivares comerciales de los que se tenía disponibles. A continuación compararemos los resultados del presente trabajo con las descripciones realizadas por otros autores.

El cultivar Agosto, del que tenemos cuatro accesiones en la colección (números 116, 132, 163 y 167), fue descrito por Herrero (1964) a partir de dos accesiones, la accesión número 1535 de Gerona (de Agosto 1535) y la accesión 1609 de la colección de Aula Dei (de Agosto 1609). La primera la describe como de color verde amarillo blanquinoso y la segunda como de blanco verdoso al amarillo crema, ambas exentas de chapa, lo cual no coincide con nuestras muestras números 116 y 163, ambas con chapa a rayas. Las 132 y 167 fueron clasificadas como

amarillas, pero su época de recolección es bastante más tardía que la señalada por Herrero (1964), el mes de agosto.

El cultivar descrito por Herrero (1964) como Blanca se corresponde morfológicamente con las accesiones 92 y 102, que hemos clasificado como productoras de manzanas amarillas, de tamaño pequeño y que se recolectan en verano. El resto de las accesiones, o bien se clasificaron como bicolores, 40, 52, 69, 80 y 156, o bien se recolectan más tarde, el 57 y 300.

Se dispone de cinco accesiones en la colección, los números 29, 41, 89, 218 y 264, que coinciden con la descripción de Laffitte (1918) del cultivar Camoesa en la provincia de Guipuzcoa y posteriormente Herrero (1964) de una muestra de Zaragoza, aunque es una variedad que se cultivaba en casi toda España (Herrero, 1964). En cuanto a fenología, Laffitte (1918) señala que florece en mayo y se produce la maduración del fruto en octubre, lo que coincide para las cinco accesiones. En el tipo de fruto, Laffitte (1918) señala que produce manzanas amarillas con una pequeña parte teñida de carmín, que la presentaron todas las accesiones, aunque el número 29 presentó una chapa más intensa. A pesar de la coincidencia general con la descripción de Laffitte (1918), la gran variación de perfiles isoenzimáticos, excepto en el caso de las accesiones 41 y 264, podría indicar que se trata de una variedad policlonal que mantiene unos rasgos generales que la identifican.

El cultivar Comadronas, número 14, eliminado por tratarse de una repetición de las accesiones 34, 60 y 184, tiene poco que ver con el cultivar Comadre de Ademuz descrito por Herrero (1964), puesto que la accesión del CIAM produjo manzanas bicolores frente a las manzanas amarillas.

La muestra recogida en el Banco como número 177, coincide bastante con la descripción realizada por Herrero (1964) de la variedad Esperiega de Ademuz, quien señaló que esta variedad se cultivaba en Coruña, así como en otras provincias de España.

El cultivar José Antonio es muy apreciado en A Coruña, del cual existen cinco accesiones en el Banco de Germoplasma del CIAM. Los números 17, 31 y 38 presentan el mismo perfil isoenzimático, pero pertenecen a distintos grupos de morfología, y análogamente sucede con las accesiones 79 y 126 (Ascasíbar, 2000), lo que parece indicar que se trata de un cultivar policlonal. Sin embargo, todos producen manzanas grandes bicolores y más anchas que altas, y coinciden con la descripción realizada por Herrero (1964).

El número 210 concuerda con la descripción realizada por Herrero (1964) para el cultivar Morro de Liebre Produce manzanas de color amarillo, pulpa blanca, jugosa y aromática.

La muestra denominada 'Pedra Dura', número 122, coincide con las características descritas por Herrero (1964) para una muestra recogida en Lugo como 'De Pedra'. Se trata de un cultivar que produce manzanas de color verde o amarillo, más anchas que altas y de tamaño medio a pequeño.

El heterogéneo grupo de los individuos recogidos como 'Peros' se debía corresponder con aquellas muestras descritas por Herrero (1964) como 'Pero do Can' y 'Pero Dorado de Galicia' de manzanas muy alargadas, cilíndricas, con forma casi de pera. Esta característica común de los 'Peros' la mantienen las accesiones 5, 81, 176, 219 y 236. Las accesiones 39, 118, 129, 145, 318, 325 y 360 no expresaron esa característica del fruto, por lo que hay que pensar que estaban mal clasificadas. Herrero (1964) describe una muestra de A Coruña con el nombre 'Pero do Can' que coincide con la introducción número 5 'Peros do Can', procedente también de A Coruña.

De Principe es un cultivar de A Coruña que describió Herrero (1964) como de color verde oliva con chapa rojiza en la zona de insolación, más o menos amplia. Las introducciones número 42 y 96 corresponden a estas características, considerándose además interesantes para ensayos posteriores.

La introducción número 312, coincide con la descripción de Herrero (1964) para el cultivar Ramona. Se trata de una variedad que produce manzanas de color amarillo, pequeñas y aplastadas.

Con el nombre de 'Rayadas' nos encontramos el número 107 del Banco, que se trata de una repetición de la variedad 'De Principe'. La accesión número 200, 'Rayada de Asturias', es una variedad bicolor, con chapa a rayas, como indica Herrero (1964).

El cultivar Redondela, número 221, es una repetición del 250, Louriñán, ambas del tipo de las bicolores, como las describió Herrero (1964).

El grupo de las 'Reinetas', de difícil definición por ser una mezcla de tipos de manzanas amarillas (Reineta Blanca), bicolores (Reineta Encarnada) y ocres, debido a la presencia de abundante russeting (Reineta Gris), se denominan a menudo en Galicia 'Tabardillas' (Ascasíbar, 2000). El perfil isoenzimático de la 252 se demostró que coincidía con el cultivar comercial Reina de Reinetas, número 1010 en la colección del CIAM. De las 24 accesiones introducidas con el nombre 'Tabardilla', los números 117, 175, 178, 192 y 193 se presentaron coincidentes en aspecto y genotipo con el cultivar comercial 'Reineta Blanca' (número 1011), lo que parece indicar que se trata de repeticiones de este cultivar o que derivan de él.

Repinaldo es una variedad que produce manzanas amarillas (Repinaldo y Repinaldo Blanco) o bien manzanas bicolores (Repinaldo Colorado), según Herrero (1964). En el Banco de Germoplasma, las accesiones 11, 75, 95, 106, 114, 139, 198, 220 y 304 produjeron manzanas amarillas, mientras que los numerados 67 y 253 produjeron manzanas bicolores. Por otra parte, es difícil extraer conclusiones en un grupo bastante heterogéneo en perfiles genéticos y grupos de morfología.

Herrero (1964) describe varias muestras con el nombre de 'Rojas' tratándose de variedades que producen manzanas bicolores. En nuestro caso solamente las accesiones

número 93 y 255 se clasificaron dentro del grupo de las rojas por presentar una chapa completa. La Roja de Julio, variedad de A Coruña, bastante difundida, no ha sido referenciada previamente por Herrero (1964). De los cuatro clones analizados con este nombre (hemos asumido que el número 26 con el nombre Julio-Septiembre podría tratarse de esta variedad), todos produjeron manzanas bicolores, aunque un tanto diferentes entre ellos por tamaño, dulzor y acidez (Ascasíbar, 2000). La accesión 26 se preseleccionó como mejor representante de este grupo para posteriores ensayos.

Sangre de Toro es una variedad que ha sido mencionada en A Coruña, Ourense y Pontevedra (Herrero, 1964) y se ha descrito que produce manzanas con una chapa casi continua de color rojo oscuro, casi negro. Las cuatro accesiones recogidas en el Banco de Germoplasma de esta variedad son distintas (Ascasíbar, 2000). La accesión preseleccionada, número 72, es la que presenta la chapa más uniforme, por lo que fue clasificada como del grupo de las rojas.

La descripción realizada por Herrero (1964) para la variedad Santiaguera no coincide con las tres introducciones del Banco de Germoplasma, puesto que habla de una variedad con chapa cobriza y, sobre ésta, pinceladas irradiadas de tono rojo marrón. Las accesiones 49 y 61 fueron clasificadas como del grupo de las rojas, mientras que la 135 en el grupo de las bicolores. Ninguna presentó russeting.

La variedad Tres en Ramo, que Herrero (1964) considera como sinónimo de Cano Torto, ha sido encontrada en A Coruña y Pontevedra. La accesión recogida como Tres en Ramo, número 205, se trata de una repetición del número 231, nombrada Tres en Cunca. Se trata de una variedad que produce manzanas de tamaño mediano con cierta presencia de russeting.

El nombre Verde o Verdosa hace referencia a un grupo heterogéneo de variedades que producen manzanas verdes o amarillas. Nuestra colección contiene un individuo de este grupo

que produce manzanas con chapa a rayas. Herrero (1964) ya hace referencia a esta denominación como confusa.

**Tabla 2. Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 *loci* de los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.**

| CISO | Accesiones | PGI1 | PGI2 | PGI3 | PGI4 | PGM1 | PGM2 | PGM3 | PGM4 | EST1 | EST4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **10**[z], **15**, 59, **96**, 107, 146, **202** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | aa | ab | ab |
| 2 | 14, **18**, **34**, **45**, **52**, 60 63, **85**, 112, **115**, 121, 134, 184, 191, **196**, **197**, **206**, 247, 260, 271, 296, 319, **364**, 368, 1030 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | ab | ab |
| 3 | **16**, **19**, **73** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | aa | aa |
| 4 | **22**, 23, **24**, **210**, **237**, **266**, **354**, **405** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | bb | aa |
| 5 | **17**, **31**, **38**, **179** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | bb | ab |
| 6 | **1**, **35**, **49**, **50**, **61**, 64, **128**, **133**, **135**, **159**, **188**, 204, **258**, **265** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | bb | ab |
| 7 | **9**, 36, **136**, 144, **302**, **303**, **376.2**, 386, 1012 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | ab | bb | aa |
| 8 | **28**, **57**, **105**, **292**, **300**, 1018, 1027 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | ab | bb |
| 9 | **8**, **65**, **101**, **363** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | aa | ab | aa |
| 10 | **11**, 70, **242**, **244**, **304**, **331** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | bb | aa |
| 11 | 53, **71**, 76, **77** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | ab | ab | ab |
| 12 | **13**, **84**, **125** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | bb | ab | aa |
| 13 | **30**, **88**, **208**, **213**, **228**, 252, **281**, **333**, **384**, **395**, 1010 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | ab | ab |
| 14 | **21**, **91**, **229**, **272**, **344**, 348, 1009, 1020 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | bb | aa |
| 15 | **74**, **98**, **103**, **104**, 130, **154**, **156**, **160**, **181**, 238, **282**, 310, **338** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | ab | ab |
| 16 | **27**, **106** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | ab | aa |
| 17 | **26**, **116**, 153, **200**, 215 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | ab | ab |
| 18 | 58, 117, **120**, **175**, 178, **183**, 192, 193, **263**, 301, **320**, **397**, 1011, 1021 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | ab | ab | ab |
| 19 | **7**, **119**, **124** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | ab | ab |
| 20 | **108**, **126** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | ab | ab |
| 21 | **39**, **131**, **287**, **367**, **378** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | ab | aa |
| 22 | **86**, **137**, **369** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | aa | aa |
| 23 | **110**, **138**, 158, **167**, **170**, **171**, **245**, 307, **321** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | ab | ab |
| 24 | **113**, **141**, **230**, **290**, **326**, **337**, 345 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | aa | ab | ab |
| 25 | **68**, **145** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | bb | bb | aa |
| 26 | **69**, **149**, **305** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | bb | bb | ab |
| 27 | **82**, **152**, **371** | aa | ab | ab | ab | ab | aa | nn | aa | ab | ab |
| 28 | **56**, **155**, **163**, **165**, **195** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | ab | ab | ab |
| 29 | 123, **161**, **289** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | ab |
| 30 | **162**, **172** | ab | ab | ab | ab | ac | aa | aa | bb | ab | ab |
| 31 | **122**, **173**, **293**, **399**, **406** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | ab |
| 32 | **177**, **185**, **186**, **335** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | bb | ab | ab |
| 33 | **169**, **199**, **268**, **274**, **291**, 339 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | ab | aa |
| 34 | **79**, **201** | ab | ab | bb | bb | aa | aa | aa | aa | bb | ab |
| 35 | 54, **205**, 231, **255**, 283 | ab | ab | ab | ab | ac | aa | aa | bb | ab | aa |
| 36 | **139**, **211**, **312**, **318** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | bb |
| 37 | **87**, **214**, **259**, **262** | aa | ab | bb | bb | abc | aa | aa | ab | ab | ab |
| 38 | **127**, 221, **250**, **343** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | ab | bb |
| 39 | **219**, **225** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | bb | aa |
| 40 | 224, **227**, **297**, 1007, 1015, 1019, 1024 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | bb | ab |

**Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 *loci* de los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.**

| CISO | Accesiones | PGI1 | PGI2 | PGI3 | PGI4 | PGM1 | PGM2 | PGM3 | PGM4 | EST1 | EST4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | **209**, **235** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | aa | aa | aa |
| 42 | **40**, 239 | aa | ab | bb | bb | abc | aa | nn | ab | bb | ab |
| 43 | 233, **248**, **254**, **295** | ab | ab | ab | ab | aa | aa | aa | aa | ab | aa |
| 44 | **41**, **264** | ab | Ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | ab | ab |
| 45 | **100**, **279**, **361** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | bb | ab | aa |
| 46 | **46**, **280** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | bb | aa |
| 47 | **241**, **284**, **351** | aa | ab | ab | ab | ac | aa | nn | ab | ab | aa |
| 48 | **218**, **285** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | bb | aa |
| 49 | **203**, **286** | aa | ab | bb | bb | abc | aa | nn | ab | ab | aa |
| 50 | **142**, 288 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | aa | ab | aa |
| 51 | **251**, **294** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | aa | ab | ab |
| 52 | **4**, **298** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | bb | ab |
| 53 | **90**, **308** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | bb | ab | ab |
| 54 | **261**, **313** | aa | ab | bb | bb | cd | aa | nn | ab | ab | ab |
| 55 | **309**, **329** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | ab | ab | bb |
| 56 | 212, **334** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | aa | bb | aa |
| 57 | **314**, 342, **377** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | bb | bb | aa |
| 58 | **350**, **353** | aa | ab | bb | bb | bb | aa | aa | ab | aa | aa |
| 59 | **349**, **356** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | bb | ab | aa |
| 60 | **355**, **357**, **390**, 1001 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | ab | ab | aa |
| 61 | **147**, **362**, 1013 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | bb | ab | ab |
| 62 | **62**, **366** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | bb | ab | aa |
| 63 | **341**, **373** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | aa | aa |
| 64 | **80**, **375** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | aa | aa |
| 65 | **78**, **376.1**, **400** | aa | ab | bb | bb | bc | aa | nn | bb | ab | aa |
| 66 | **129**, 380 | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | bb | ab | bb |
| 67 | **97**, **383** | aa | ab | ab | ab | cc | aa | nn | ab | ab | ab |
| 68 | **166**, **387**, 1002, 1016 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | ab | ab |
| 69 | **189**, **388** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | aa | ab | ab |
| 70 | **132**, **396** | aa | bn | nn | bb | ac | aa | nn | ab | ab | aa |
| 71 | **83**, **408** | aa | ab | ab | ab | ac | aa | nn | aa | ab | ab |
| 72 | 1004, 1005 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | aa | ab | bb |
| 73 | **352**, 1008 | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | aa | aa | ab |
| 74 | 1017, 1031 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | bb | bb |
| 75 | **29** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | bb | aa |
| 76 | **42** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | bb | ab |
| 77 | **25** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | aa | bb | ab |
| 78 | **109** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | aa | bb | ab | aa |
| 79 | **95** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | bb |
| 80 | **5** | ab | ab | bb | bb | aa | aa | nn | aa | ab | aa |
| 81 | **234** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | ab | ab |
| 82 | **249** | ab | ab | bb | bb | aa | aa | aa | ab | ab | ab |
| 83 | **256** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | bb | aa |
| 84 | **277** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | ab | ab |
| 85 | **226** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | ab | bb |
| 86 | **299** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | ab | bb |
| 87 | **328** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | bb | aa |
| 88 | **374** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | bb | ab |
| 89 | **114** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | aa |

**Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 *loci* de los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.**

| CISO | Accesiones | PGI1 | PGI2 | PGI3 | PGI4 | PGM1 | PGM2 | PGM3 | PGM4 | EST1 | EST4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | **379** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | ab | aa |
| 91 | **398** | ab | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | ab | ab |
| 92 | **157** | ab | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | bb | ab |
| 93 | 1025 | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | bb | ab |
| 94 | **20** | aa | ab | ab | ab | cd | aa | nn | ab | ab | aa |
| 95 | **32** | aa | ab | ab | ab | cd | aa | nn | ab | ab | ab |
| 96 | **33** | aa | ab | bb | bb | acd | aa | nn | ab | ab | aa |
| 97 | **47** | aa | ab | bb | bb | bb | aa | nn | aa | ab | aa |
| 98 | **43** | aa | ab | ab | ab | ab | aa | nn | ab | bb | ab |
| 99 | **51** | aa | ab | ab | ab | ab | aa | nn | ab | bb | aa |
| 100 | **92** | aa | ab | ab | ab | cc | aa | nn | ab | ab | aa |
| 101 | **99** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | ab | ab | bb |
| 102 | **102** | aa | ab | ab | ab | ac | aa | nn | ab | ab | ab |
| 103 | **44** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | bb | bb | bb |
| 104 | **93** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | ab | ab | ab |
| 105 | **150** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | bb | ab | ab |
| 106 | **168** | aa | ab | bb | bb | bc | aa | nn | bb | ab | ab |
| 107 | **174** | aa | ab | bb | bb | abc | aa | nn | bb | ab | ab |
| 108 | **12** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | aa | ab |
| 109 | **182** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | aa | ab |
| 110 | **140** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | ab | bb | bb |
| 111 | **187** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | ab | bb | ab |
| 112 | **190** | aa | ab | bb | bb | ac | nn | aa | ab | ab | ab |
| 113 | **194** | aa | ab | bb | bb | ac | nn | aa | ab | aa | ab |
| 114 | **176** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | ab | aa | ab |
| 115 | **216** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | aa | ab |
| 116 | **240** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | ab | ab | aa |
| 117 | **143** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | ab | bb | ab |
| 118 | **243** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | bb | bb | ab |
| 119 | **246** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | ab | aa |
| 120 | **276** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | nn | aa | bb | ab |
| 121 | **278** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | ab | ab |
| 122 | **322** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | ab | bb | aa |
| 123 | **332** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | aa | aa | ab | aa |
| 124 | **340** | aa | bb | nn | bb | ac | aa | nn | ab | ab | aa |
| 125 | **306** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | ab | aa | ab |
| 126 | **346** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | aa | ab |
| 127 | **336** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | ab | ab | aa |
| 128 | **273** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | aa | ab |
| 129 | **360** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | ab | ab | bb |
| 130 | **81** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | bb | aa | aa |
| 131 | **365** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | ab | aa | aa |
| 132 | **323** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | bb | aa | ab |
| 133 | **392** | aa | ab | bb | bb | bb | aa | nn | bb | aa | ab |
| 134 | **55** | aa | bb | nn | ab | acd | aa | nn | aa | ab | aa |
| 135 | **393** | aa | bb | nn | ab | ac | aa | nn | aa | ab | aa |
| 136 | **382** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | bb | ab | bb |
| 137 | **401** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | bb | bb | bb |
| 138 | **347** | aa | ab | bb | bb | abcd | aa | nn | ab | bb | aa |

**Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 *loci* de los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.**

| CISO | Accesiones | PGI1 | PGI2 | PGI3 | PGI4 | PGM1 | PGM2 | PGM3 | PGM4 | EST1 | EST4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | **403** | aa | ab | bb | bb | abcd | aa | nn | bb | bb | aa |
| 140 | **257** | aa | ab | bb | bb | acd | aa | nn | ab | bb | ab |
| 141 | 1023 | aa | ab | bb | bb | acd | aa | nn | ab | ab | ab |
| 142 | 1026 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | ab | bb |
| 143 | **404** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | aa | bb |
| 144 | 1028 | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | aa | ab | bb |
| 145 | **267** | ab | ab | bb | bb | abc | aa | aa | aa | bb | ab |
| 146 | **381** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | nn | aa | ab | ab |
| 147 | **148** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | bb | ab | ab |
| 148 | **118** | aa | ab | bb | bb | abc | aa | aa | aa | ab | ab |
| 149 | **48** | ab | ab | bb | bb | aa | aa | aa | aa | bb | aa |
| 150 | **72** | aa | ab | bb | bb | cd | aa | nn | bb | ab | bb |
| 151 | **385** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | nn | aa | aa | ab |
| 152 | **75** | aa | ab | bb | bb | ac | aa | aa | aa | bb | ab |
| 153 | **324** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | bb | bb | aa |
| 154 | **311** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | bb | ab |
| 155 | **370** | aa | ab | bb | bb | cd | aa | nn | bb | ab | aa |
| 156 | **407** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | ab | aa | bb |
| 157 | 1029 | aa | ab | ab | ab | ab | aa | nn | ab | ab | aa |
| 158 | **389** | aa | ab | bb | bb | aa | aa | nn | bb | ab | aa |
| 159 | **111** | aa | ab | bb | bb | dd | aa | nn | ab | ab | ab |
| 160 | **6** | aa | ab | ab | ab | cc | aa | aa | aa | aa | aa |
| 161 | **217** | aa | ab | ab | ab | cc | aa | aa | ab | aa | ab |
| 162 | **151** | ab | ab | ab | ab | aa | aa | nn | aa | ab | aa |
| 163 | **220** | aa | ab | bb | bb | aa | nn | aa | ab | ab | bb |
| 164 | **327** | aa | ab | bb | bb | ac | nn | aa | ab | bb | bb |
| 165 | **330** | aa | ab | bb | bb | ab | aa | aa | bb | aa | aa |
| 166 | **89** | ab | ab | bb | bb | abc | aa | nn | ab | ab | ab |
| 167 | **358** | ab | ab | bb | bb | bc | aa | nn | aa | ab | ab |
| 168 | **164** | aa | ab | bb | bb | ab | nn | nn | ab | ab | ab |
| 169 | **359** | aa | ab | bb | bb | ab | nn | aa | ab | ab | ab |
| 170 | **37** | aa | ab | ab | ab | ab | aa | nn | aa | aa | aa |
| 171 | **275** | aa | ab | ab | ab | aa | aa | aa | ab | ab | aa |
| 172 | **66** | aa | bb | nn | ab | ac | aa | aa | aa | ab | aa |
| 173 | **207** | ab | ab | bb | bb | ac | nn | aa | ab | aa | aa |
| 174 | **232** | ab | ab | bb | bb | ab | aa | nn | aa | aa | aa |
| 175 | **253** | aa | ab | bb | bb | cd | aa | nn | ab | bb | aa |
| 176 | **317** | aa | ab | bb | bb | ac | nn | aa | bb | ab | aa |
| 177 | **391** | aa | ab | ab | ab | ab | aa | aa | aa | ab | ab |
| 178 | **236** | aa | ab | bb | bb | cd | aa | nn | ab | aa | bb |
| 179 | **269** | ab | ab | ab | ab | ac | aa | aa | ab | bb | ab |
| 180 | **3** | ab | ab | bb | bb | bc | aa | nn | bb | ab | bb |
| 181 | **67** | aa | ab | bb | bb | bc | aa | nn | aa | bb | aa |
| 182 | **372** | bb | bb | bb | bb | bc | aa | nn | ab | ab | ab |
| 183 | **94** | aa | ab | ab | ab | cc | aa | nn | bb | aa | aa |
| 184 | **222** | aa | ab | bb | bb | aa | nn | aa | aa | aa | ab |
| 185 | **394** | ab | ab | bb | bb | bc | aa | nn | aa | aa | bb |
| 186 | **198** | aa | bb | nn | bb | cc | aa | aa | aa | ab | bb |
| 187 | **325** | aa | ab | bb | bb | cc | aa | aa | aa | bb | bb |

**Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 *loci* de los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.**

| CISO | Accesiones | PGI1 | PGI2 | PGI3 | PGI4 | PGM1 | PGM2 | PGM3 | PGM4 | EST1 | EST4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | **270** | aa | ab | ab | ab | abc | aa | nn | bb | bb | ab |
| 189 | **402** | ab | ab | ab | ab | cc | aa | nn | aa | bb | ab |
| 190 | **223** | aa | bb | nn | ab | ab | aa | aa | ab | ab | ab |

[z]En negrita los individuos que se propone conservar en el Banco de Germoplasma por presentar un distinto perfil isoenzimático y/o morfológico.

# I. CULTIVARES PRESELECCIONADOS

**GRUPO DE LAS AMARILLAS**

## Tres en Cunca

**Número de identificación en la colección:** 19
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta

**Pulgón lanígero:** no presenta
**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

## Tres en Cunca y Otra

**Número de identificación en la colección:** 22
**Procedencia:** San Juan de Piñeiros (A Coruña)
**Latitud:** 43º26'
**Longitud:** 4º31'
**Altitud:** 92 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácidas y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

## Camoesa

**Número de identificación en la colección:** 41
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácidas y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tres en Cunca

**Número de identificación en la colección:** 85
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 103
**Procedencia:** Rus (A Coruña)
**Latitud:** 43º 12'
**Longitud:** 8º 41'
**Altitud:** 184 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 14 mayo
**Recolección (K):** 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-alta y no dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Libra

**Número de identificación en la colección:** 154
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 14 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 188
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácidas y dulces
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Do Apóstol

**Número de identificación en la colección:** 245
**Procedencia:** Cambados (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 5º 07'
**Altitud:** 16 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-alta y no dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Camoesa

**Número de identificación en la colección:** 264
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 12 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 275
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-alta y no dulce
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 304
**Procedencia:** Alfoz (Lugo)
**Latitud:** 43º 31'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 80 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tardía

**Número de identificación en la colección:** 311
**Procedencia:** Masma (Lugo)
**Latitud:** 43º 25'
**Longitud:** 7º 21'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-alta y no dulce
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peros Blancos

**Número de identificación en la colección:** 360
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media y dulzor bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 398
**Procedencia:** Regadas (Ourense)
**Latitud:** 42º 19'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 249 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 marzo
**Floración (F2):** 22 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** no ácidas y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Morro de Liebre

**Número de identificación en la colección:** 210
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** desconocido
**Máxima anchura del limbo:** desconocido
**Longitud de las estípulas**: desconocido
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** desconocido
**Forma del ápice del limbo:** desconocido
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Reina de Reinetas

**Número de identificación en la colección:** 357
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** mixto

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Gravillán

**Número de identificación en la colección:** 396
**Procedencia:** Barrio (Ourense)
**Latitud:** 42º 27'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 452 m.

**Destino:** mixto

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 9 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Puebla

**Número de identificación en la colección:** 408
**Procedencia:** desconocida
**Latitud:** no disponible
**Longitud:** no disponible
**Altitud:** no disponible

**Destino:** mixto

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## GRUPO DE LAS BICOLORES

## Marafouza

**Número de identificación en la colección:** 6
**Procedencia:** Mañon (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 325 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-alta y dulzor bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Parafreir (Suiza)

**Número de identificación en la colección:** 9
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acida y dulzor bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

**Francesa Muy**

**Número de identificación en la colección:** 10
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGÍA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Reineta

**Número de identificación en la colección:** 15
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-alta y dulzor bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

**José Antonio**

**Número de identificación en la colección:** 17
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGÍA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas: desconocido**
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Grande Dulce

**Número de identificación en la colección:** 18
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 28 marzo
**Floración (F2):** 22 abril
**Recolección (K):** 22 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Grande Plana Verde

**Número de identificación en la colección:** 24
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas: desconocido**
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Julio- Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 26
**Procedencia:** San Juan de Piñeiros (A Coruña)
**Latitud:** 43º26'
**Longitud:** 4º31'
**Altitud:** 92 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-alta y no dulce
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Muy Grande

**Número de identificación en la colección:** 56
**Procedencia:** Pobra de Brollon (Lugo)
**Latitud:** 42º 33'
**Longitud:** 7º 23'
**Altitud:** 399 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-alta y dulzor bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca Cerosa

**Número de identificación en la colección:** 69
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a manchas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** no ácida y dulzor medio
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

# Grande Plana Estriada

**Número de identificación en la colección:** 71
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** mixto

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 1 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana a plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media y dulzor medio-bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

# Camba

**Número de identificación en la colección:** 82
**Procedencia:** Rodeiro (Pontevedra)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 398 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 91
**Procedencia:** Cambre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 17'
**Longitud:** 8º 20'
**Altitud:** 65 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácidas y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Príncipe Grande

**Número de identificación en la colección:** 96
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** mixto

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa a globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.
**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media

**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Negras

**Número de identificación en la colección:** 108
**Procedencia:** Carballo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 5º 01'
**Altitud:** 106 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácida y dulzor medio
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Roja

**Número de identificación en la colección:** 127
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácida y dulzor medio
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Rayas

**Número de identificación en la colección:** 141
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 24 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas: desconocido**
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca Plana

**Número de identificación en la colección:** 156
**Procedencia:** Dodro (A Coruña)
**Latitud:** 42º 42'
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 22 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 marzo
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Agosto

**Número de identificación en la colección:** 163
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## De Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 165
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media y dulzor bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 171
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 19 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** no ácida y dulzor medio
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Rayada de Asturias

**Número de identificación en la colección:** 200
**Procedencia:** Saidres (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 436 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Real

**Número de identificación en la colección:** 227
**Procedencia:** Ribeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 141 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez baja y dulces
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 230
**Procedencia:** Meabía (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 35'
**Longitud:** 8º 21'
**Altitud:** 569 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 14 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 28 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja y dulce
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Parda

**Número de identificación en la colección:** 266
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura ahoyada, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acida y dulzor bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 313
**Procedencia:** Guitiriz (Lugo)
**Latitud:** 43º 10'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 420 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 6 abril
**Recolección (K):** 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media y no dulce
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 328
**Procedencia:** Saá (Lugo)
**Latitud:** 43º 00'
**Longitud:** 7º 33'
**Altitud:** 520 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 16 abril
**Recolección (K):** 11 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Reineta

**Número de identificación en la colección:** 334
**Procedencia:** Rececende (Lugo)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 7º 11'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

**GRUPO DE LAS ROJAS**

## Asturias

**Número de identificación en la colección:** 44
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 18 abril
**Recolección (K):** 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanco-crema-rosado
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Sangre de Toro

**Número de identificación en la colección:** 72
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 19 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** ligeramente rosada
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Arriscadas

**Número de identificación en la colección:** 77
**Procedencia:** Reboredo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 20 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 240
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 241
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Mixta

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 marzo
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Roja de Verano

**Número de identificación en la colección:** 258
**Procedencia:** Castrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 28'
**Longitud:** 5º 07'
**Altitud:** 20 m.

**Destino:** Sidra

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 4 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media y no dulce
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Santa Marta

**Número de identificación en la colección:** 389
**Procedencia:** Partovia (Ourense)
**Latitud:** 42º25'
**Longitud:** 8º 04'
**Altitud:** 278 m.

**Destino:** Mesa

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 8 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** acidez baja y dulzor medio-bajo
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** desconocido
**Máxima anchura del limbo:** desconocido
**Longitud de las estípulas**: desconocido
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** desconocido
**Forma del ápice del limbo:** desconocido
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# II CULTIVARES A CONSERVAR EN EL BANCO DE GERMOPLASMA

## Roja de Julio

**Número de identificación en la colección:** 1
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 28 marzo
**Floración (F2):** 15 abril
**Recolección (K):** 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: desconocido
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 3
**Procedencia:** Landoi (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 37 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ollo Landoy

**Número de identificación en la colección:** 4
**Procedencia:** Landoi (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 37 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 24 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peros do Can

**Número de identificación en la colección:** 5
**Procedencia:** Landoi (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 37 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Allo Mouro

**Número de identificación en la colección:** 7
**Procedencia:** Landoi (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 37 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Ardio

**Número de identificación en la colección:** 8
**Procedencia:** Landoi (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 37 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 14 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Repinaldo Octubre

**Número de identificación en la colección:** 11
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Grande Plana

**Número de identificación en la colección:** 12
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 18 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Dulce

**Número de identificación en la colección:** 13
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 18 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas: desconocido**
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 16
**Procedencia:** Lians (A Coruña)
**Latitud:** 43º 19'
**Longitud:** 8º 18'
**Altitud:** 58 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 15 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca de Julio

**Número de identificación en la colección:** 20
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** desconocido
**Chapa:** desconocido
**Forma:** desconocido
**Tamaño:** desconocido
**Epidermis:** desconocido
**Sensibilidad al russeting:** desconocido
**Tamaño lenticelas: desconocido**
**Disposición de los sépalos: desconocido**.
**Fosa calicina (profundidad y anchura):** desconocido

**Pedúnculo (grosor y longitud):** desconocido
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** desconocido
**Color de la pulpa:** desconocido
**Firmeza de la pulpa:** desconocido
**Textura de la pulpa:** desconocido
**Jugosidad:** desconocido
**Sabor:** desconocido
**Aroma:** desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** crenado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Francesa

**Número de identificación en la colección:** 21
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** ataque medio
**Chancro:** no presenta

# Grandísima Amarilla

**Número de identificación en la colección:** 25
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** ataque medio
**Chancro:** no presenta

## Tardía de Marzo

**Número de identificación en la colección:** 27
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# De Cera Agosto

**Número de identificación en la colección:** 28
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Camoesa Fina

**Número de identificación en la colección:** 29
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Francesa

**Número de identificación en la colección:** 30
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 24 abril
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## José Antonio

**Número de identificación en la colección:** 31
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Mayo Blanca

**Número de identificación en la colección:** 32
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 7 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** completa, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Mazá Fresca

**Número de identificación en la colección:** 33
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 19 abril
**Recolección (K):** 19 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Pera

**Número de identificación en la colección:** 34
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 26 marzo
**Floración (F2):** 21 abril
**Recolección (K):** 15 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Roja de Julio

**Número de identificación en la colección:** 35
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 marzo
**Floración (F2):** 18 abril
**Recolección (K):** 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a manchas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Romana

**Número de identificación en la colección:** 37
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## José Antonio

**Número de identificación en la colección:** 38
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pero Canela

**Número de identificación en la colección:** 39
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca Estriada

**Número de identificación en la colección:** 40
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Príncipe

**Número de identificación en la colección:** 42
**Procedencia:** Pontedeume (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 27 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Morenas

**Número de identificación en la colección:** 43
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** ocre
**Chapa:** fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tres en Cunca

**Número de identificación en la colección:** 45
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Cobadia

**Número de identificación en la colección:** 46
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Santa María

**Número de identificación en la colección:** 47
**Procedencia:** Oza dos Rios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 190 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 17 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Grande Plana

**Número de identificación en la colección:** 48
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Santiaguesa

**Número de identificación en la colección:** 49
**Procedencia:** Oza dos Rios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 190 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** ligeramente rosada
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Manzana de Julio

**Número de identificación en la colección:** 50
**Procedencia:** Oza dos Rios (A Coruña)
**Latitud:** 44º 13'
**Longitud:** 9º 10'
**Altitud:** 190 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 18 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** desconocido
**Chapa:** desconocido
**Forma:** desconocido
**Tamaño:** desconocido
**Epidermis** desconocido
**Sensibilidad al russeting:** desconocido
**Tamaño lenticelas:** desconocido
**Disposición de los sépalos:** desconocido

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** desconocido **Pedúnculo (grosor y longitud):** desconocido
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** desconocido
**Color de la pulpa:** desconocido
**Firmeza de la pulpa:** desconocido
**Textura de la pulpa:** desconocido
**Jugosidad:** desconocido
**Sabor:** desconocido
**Aroma:** desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Parda

**Número de identificación en la colección:** 51
**Procedencia:** Oza dos Rios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 190 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** ocre
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca Plana

**Número de identificación en la colección:** 52
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 marzo
**Floración (F2):** 17 abril
**Recolección (K):** 8 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Tardía

**Número de identificación en la colección:** 55
**Procedencia:** Laraxe (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 09'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blancas

**Número de identificación en la colección:** 57
**Procedencia:** Pontedeume (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 27 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 18 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Santiaguesas

**Número de identificación en la colección:** 61
**Procedencia:** Oza dos Rios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 190 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 1 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Muy Grande Aplanada

**Número de identificación en la colección:** 62
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** ligeramente rosada
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Manzana de Invierno

**Número de identificación en la colección:** 65
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Roja

**Número de identificación en la colección:** 66
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a manchas, intensidad media
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Repinaldo Rojo

**Número de identificación en la colección:** 67
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Reineta

**Número de identificación en la colección:** 68
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 28 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca Rojo

**Número de identificación en la colección:** 73
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 29 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tabardilla Blanca

**Número de identificación en la colección:** 74
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 11 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Repinaldo Branca

**Número de identificación en la colección:** 75
**Procedencia:** Doroña (A Coruña)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 160 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Cascuda

**Número de identificación en la colección:** 78
**Procedencia:** Pontedeume (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 27 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** rojo
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** desconocido
**Pedúnculo (grosor y longitud):** desconocido
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** desconocido
**Color de la pulpa:** desconocido
**Firmeza de la pulpa:** desconocido
**Textura de la pulpa:** desconocido
**Jugosidad:** desconocido
**Sabor:** desconocido
**Aroma:** desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: desconocido
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a José Antonio

**Número de identificación en la colección:** 79
**Procedencia:** Revolta (A Coruña)
**Latitud:** 43º 28'
**Longitud:** 8º 09'
**Altitud:** 50 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 10 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blanca

**Número de identificación en la colección:** 80
**Procedencia:** Revolta (A Coruña)
**Latitud:** 43º 28'
**Longitud:** 8º 09'
**Altitud:** 50 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 marzo
**Floración (F2):** 21 abril
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peros Camba

**Número de identificación en la colección:** 81
**Procedencia:** Rodeiro (Pontevedra)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 398 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** elíptica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pequeña Verde

**Número de identificación en la colección:** 83
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 21 abril
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Sangre de Toro

**Número de identificación en la colección:** 84
**Procedencia:** Andrade (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 315 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 25 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Plátano

**Número de identificación en la colección:** 86
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tarde

**Número de identificación en la colección:** 87
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Romana

**Número de identificación en la colección:** 88
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 20 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Camoesa Dulce Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 89
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Roja de Julio

**Número de identificación en la colección:** 90
**Procedencia:** Lubre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 34'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Blanca de Julio

**Número de identificación en la colección:** 92
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 23 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Roja Estriada

**Número de identificación en la colección:** 93
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Reinetas

**Número de identificación en la colección:** 94
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 95
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 14 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 97
**Procedencia:** Laiño (A Coruña)
**Latitud:** 42º 42º
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 98
**Procedencia:** Pasaxe do Pedrido (A Coruña)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 4º 32'
**Altitud:** 130 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 21 abril
**Recolección (K):** 4 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Verdosa Temprana

**Número de identificación en la colección:** 99
**Procedencia:** Pobra de Brollon (Lugo)
**Latitud:** 42º 33'
**Longitud:** 7º 23'
**Altitud:** 399 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 24 abril
**Recolección (K):** 15 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Verdosa Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 100
**Procedencia:** Veiga (Lugo)
**Latitud:** 42º 33'
**Longitud:** 7º 23'
**Altitud:** 399 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Pontellas

**Número de identificación en la colección:** 101
**Procedencia:** Crendes (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 17'
**Altitud:** 40 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blancas 2º Julio

**Número de identificación en la colección:** 102
**Procedencia:** Sillobre (A Coruña)
**Latitud:** 43º 28'
**Longitud:** 8º 09'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Julio

**Número de identificación en la colección:** 104
**Procedencia:** Leixa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 28'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 20 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 26 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 6 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 105
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 106
**Procedencia:** Carballo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 5º 01'
**Altitud:** 106 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Rojas

**Número de identificación en la colección:** 109
**Procedencia:** Carballo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 5º 01'
**Altitud:** 106 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 14 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 110
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 13 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Troncocónicas

**Número de identificación en la colección:** 111
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Blandas Rayas

**Número de identificación en la colección:** 113
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 14 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Repinaldo Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 114
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 17 mayo
**Recolección (K):** 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tardías

**Número de identificación en la colección:** 115
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Agosto

**Número de identificación en la colección:** 116
**Procedencia:** Nogueirosa (A Coruña)
**Latitud:** 43º 24'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 30 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peros

**Número de identificación en la colección:** 118
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 14 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque fuerte
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peraza

**Número de identificación en la colección:** 119
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 120
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pedra Dura

**Número de identificación en la colección:** 122
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ollo Blanco

**Número de identificación en la colección:** 124
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 abril
**Floración (F2):** 27 mayo
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana Blanca

**Número de identificación en la colección:** 125
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 4 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** elíptico-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a José Antonio

**Número de identificación en la colección:** 126
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 3 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De San Juan Roja

**Número de identificación en la colección:** 128
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 28 marzo
**Floración (F2):** 19 abril
**Recolección (K):** 1 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Pero

**Número de identificación en la colección:** 129
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 131
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 15 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** desconocido
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Agosto

**Número de identificación en la colección:** 132
**Procedencia:** Senra (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 361 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 133
**Procedencia:** Loiba (A Coruña)
**Latitud:** 43º 40'
**Longitud:** 7º 51'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Santiaguesa

**Número de identificación en la colección:** 135
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 136
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 137
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 20 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 138
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 139
**Procedencia:** Burricios (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** completa, intensidad pálida
**Forma:** elíptico-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 140
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 142
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Julio

**Número de identificación en la colección:** 143
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 16 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pero Dulce

**Número de identificación en la colección:** 145
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 30 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Blanca

**Número de identificación en la colección:** 147
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 148
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 149
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 150
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 marzo
**Floración (F2):** 8 abril
**Recolección (K):** 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Invierno

**Número de identificación en la colección:** 151
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 14 mayo
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** intermedia-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 152
**Procedencia:** Herbón (A Coruña)
**Latitud:** 42º 44'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 60 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## De Noya

**Número de identificación en la colección:** 155
**Procedencia:** Dodro (A Coruña)
**Latitud:** 42º 42'
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 22 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 17 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Roja Muy Fuerte

**Número de identificación en la colección:** 157
**Procedencia:** Dodro (A Coruña)
**Latitud:** 42º 42'
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 22 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 10 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Parecida a Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 159
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 160
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 12 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 161
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 17 abril
**Recolección (K):** 28 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Mediana Agosto

**Número de identificación en la colección:** 162
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Parda

**Número de identificación en la colección:** 164
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 166
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Agosto

**Número de identificación en la colección:** 167
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 168
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 28 abril
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanco-rosado
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 169
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Roja Plana

**Número de identificación en la colección:** 170
**Procedencia:** Noia (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 10 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 21 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Cacharela o Tres en Cunca

**Número de identificación en la colección:** 172
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 26 abril
**Floración (F2):** 23 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Muleiriña

**Número de identificación en la colección:** 173
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** Erectos convergentes, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 174
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 22 abril
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Antigua

**Número de identificación en la colección:** 175
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Peiro

**Número de identificación en la colección:** 176
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 11 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** elíptico-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Esperiega Ademuz

**Número de identificación en la colección:** 177
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 179
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 181
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Rabala

**Número de identificación en la colección:** 182
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 26 abril
**Floración (F2):** 17 mayo
**Recolección (K):** 19 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 183
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 6 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Do Cú Negro

**Número de identificación en la colección:** 185
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 186
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 19 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tabardilla Blanca

**Número de identificación en la colección:** 187
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 189
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Canle

**Número de identificación en la colección:** 190
**Procedencia:** Sta.Mª.Roo (A Coruña)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 53'
**Altitud:** 129 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Verdellas

**Número de identificación en la colección:** 194
**Procedencia:** Reboredo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Duras

**Número de identificación en la colección:** 195
**Procedencia:** Reboredo (A Coruña)
**Latitud:** 43º 13'
**Longitud:** 8º 10'
**Altitud:** 219 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a De Cera

**Número de identificación en la colección:** 196
**Procedencia:** Sigras (Pontevedra)
**Latitud:** 43º 17'
**Longitud:** 8º 20'
**Altitud:** 72 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 10 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 197
**Procedencia:** Sigras (Pontevedra)
**Latitud:** 43º 17'
**Longitud:** 8º 20'
**Altitud:** 72 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Parecida a Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 198
**Procedencia:** Saidres (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 436 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 3 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Folla

**Número de identificación en la colección:** 199
**Procedencia:** Saidres (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 436 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 abril
**Floración (F2):** 23 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Negras

**Número de identificación en la colección:** 201
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tardía de Octubre

**Número de identificación en la colección:** 202
**Procedencia:** Saidres (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 436 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 mayo
**Floración (F2):** 28 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## San Lorenzo

**Número de identificación en la colección:** 203
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tres en Rama

**Número de identificación en la colección:** 205
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 14 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 206
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 17 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Mariñas

**Número de identificación en la colección:** 207
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 mayo
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 208
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 21 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 209
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** erectos, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** desconocido
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Santa María

**Número de identificación en la colección:** 211
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 213
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 7 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura rugosa, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Cedo

**Número de identificación en la colección:** 214
**Procedencia:** Breixa (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 41'
**Longitud:** 8º 14'
**Altitud:** 469 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 27 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** salpicada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Do Prado da Cima

**Número de identificación en la colección:** 216
**Procedencia:** Cristimil (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 39'
**Longitud:** 8º 06'
**Altitud:** 496 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 mayo
**Floración (F2):** 23 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Fariñentas

**Número de identificación en la colección:** 217
**Procedencia:** Cristimil (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 39'
**Longitud:** 8º 06'
**Altitud:** 496 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Camoesa Dulce

**Número de identificación en la colección:** 218
**Procedencia:** Cristimil (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 39'
**Longitud:** 8º 06'
**Altitud:** 496 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 24 abril
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 23 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pero Dulce

**Número de identificación en la colección:** 219
**Procedencia:** Santeles de Abaixo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 mayo
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pero Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 220
**Procedencia:** Santeles de Abaixo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 mayo
**Floración (F2):** 24 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 222
**Procedencia:** Santeles (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 192 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 mayo
**Floración (F2):** 21 mayo
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** desconocido
**Forma del ápice del limbo:** desconocido
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** ataque débil
**Chancro:** no presenta

# Freixerana

**Número de identificación en la colección:** 223
**Procedencia:** Santeles (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 192 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 7 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pimienta

**Número de identificación en la colección:** 225
**Procedencia:** Ribeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 141 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# De Rioboi

**Número de identificación en la colección:** 226
**Procedencia:** Ribeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 141 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 16 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla Parda

**Número de identificación en la colección:** 228
**Procedencia:** Ribeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 47'
**Longitud:** 8º 29'
**Altitud:** 141 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** ocre
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura rugosa, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tardía

**Número de identificación en la colección:** 229
**Procedencia:** Meabía (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 35'
**Longitud:** 8º 21'
**Altitud:** 569 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 232
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 mayo
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** desconocido
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque fuerte

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Faba

**Número de identificación en la colección:** 234
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 235
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 marzo
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 27 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Pero

**Número de identificación en la colección:** 236
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** oblonga-truncada
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 237
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Amarilla Julio

**Número de identificación en la colección:** 242
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Reineta

**Número de identificación en la colección:** 243
**Procedencia:** Portas (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 34'
**Longitud:** 8º 39'
**Altitud:** 86 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 marzo
**Floración (F2):** 17 abril
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De San Juan Roja

**Número de identificación en la colección:** 244
**Procedencia:** La Lomba (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 35'
**Longitud:** 8º 45'
**Altitud:** 32 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 8 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 246
**Procedencia:** Cambados (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 5º 07'
**Altitud:** 16 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pata de Mula

**Número de identificación en la colección:** 248
**Procedencia:** Insua (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 24 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** intermedia-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Café

**Número de identificación en la colección:** 249
**Procedencia:** Insua (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 11 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Louriñán

**Número de identificación en la colección:** 250
**Procedencia:** Insua (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 abril
**Floración (F2):** 20 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Xaneira

**Número de identificación en la colección:** 251
**Procedencia:** Insua (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Repinaldo

**Número de identificación en la colección:** 253
**Procedencia:** Insua (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** elíptico-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Vizcaiña

**Número de identificación en la colección:** 254
**Procedencia:** Meaño (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 26'
**Longitud:** 8º 46'
**Altitud:** 82 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 255
**Procedencia:** Meaño (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 26'
**Longitud:** 8º 46'
**Altitud:** 82 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Toca Pandeiro

**Número de identificación en la colección:** 256
**Procedencia:** Meaño (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 26'
**Longitud:** 8º 46'
**Altitud:** 82 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Roja de Verano

**Número de identificación en la colección:** 257
**Procedencia:** Castrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 28'
**Longitud:** 5º 07'
**Altitud:** 20 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## De Puebla

**Número de identificación en la colección:** 259
**Procedencia:** desconocida
**Latitud:** no disponible
**Longitud:** no disponible
**Altitud:** no disponible

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 261
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 18 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 262
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Golden Gallega

**Número de identificación en la colección:** 263
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## De San Juan

**Número de identificación en la colección:** 265
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 30 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 267
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 19 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 268
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** salpicada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 269
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 4 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 270
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 272
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 273
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 13 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 274
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 276
**Procedencia:** Torres Agrelo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 36'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 23 abril
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Espleje

**Número de identificación en la colección:** 277
**Procedencia:** Moaña (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 16'
**Longitud:** 8º 44'
**Altitud:** 135 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Paxeta

**Número de identificación en la colección:** 278
**Procedencia:** Moaña (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 16'
**Longitud:** 8º 44'
**Altitud:** 135 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Cregueira

**Número de identificación en la colección:** 279
**Procedencia:** Seixo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 82 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Caguleira o Presente

**Número de identificación en la colección:** 280
**Procedencia:** Seixo (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 8º 42'
**Altitud:** 82 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Parecida a Cox

**Número de identificación en la colección:** 281
**Procedencia:** Lourizán (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 25'
**Longitud:** 8º 38'
**Altitud:** 20 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 21 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Albariña

**Número de identificación en la colección:** 282
**Procedencia:** Barbuntin (Pontevedra)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 8º 50'
**Altitud:** m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 22 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## San Antonio

**Número de identificación en la colección:** 284
**Procedencia:** Caselas (Pontevedra)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 8º 50'
**Altitud:** 360 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 24 abril
**Recolección (K):** 30 julio

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Piolla

**Número de identificación en la colección:** 285
**Procedencia:** Caselas (Pontevedra)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 8º 50'
**Altitud:** 360 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Riscadas

**Número de identificación en la colección:** 286
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 mayo
**Floración (F2):** 22 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Riscadas

**Número de identificación en la colección:** 287
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 mayo
**Floración (F2):** 27 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Luneda

**Número de identificación en la colección:** 289
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 5 mayo
**Floración (F2):** 26 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Costoya

**Número de identificación en la colección:** 290
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 23 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Altonobles

**Número de identificación en la colección:** 291
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 28 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Dulce

**Número de identificación en la colección:** 292
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Dos Enfermos

**Número de identificación en la colección:** 293
**Procedencia:** Cerdeira (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 05'
**Longitud:** 8º 25'
**Altitud:** 461 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 29 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Mazá de Todo o Ano

**Número de identificación en la colección:** 294
**Procedencia:** Gulans (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 10'
**Longitud:** 8º 30'
**Altitud:** 96 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 295
**Procedencia:** Vedra (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 28'
**Altitud:** 198 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 22 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 297
**Procedencia:** Vedra (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 28'
**Altitud:** 198 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a Golden

**Número de identificación en la colección:** 298
**Procedencia:** Vedra (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 28'
**Altitud:** 198 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 9 abril
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 299
**Procedencia:** Vedra (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 28'
**Altitud:** 198 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 marzo
**Floración (F2):** 12 junio
**Recolección (K):** 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Blanca

**Número de identificación en la colección:** 300
**Procedencia:** Vedra (Pontevedra)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 8º 28'
**Altitud:** 198 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 marzo
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 302
**Procedencia:** Ferreira Vella (Lugo)
**Latitud:** 43º 20'
**Longitud:** 7º 15'
**Altitud:** 485 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 303
**Procedencia:** Alfoz (Lugo)
**Latitud:** 43º 31'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 80 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a Reineta Encarnada

**Número de identificación en la colección:** 305
**Procedencia:** Alfoz (Lugo)
**Latitud:** 43º 31'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 80 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 306
**Procedencia:** Adelan (Lugo)
**Latitud:** 43º 31'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 80 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 11 mayo
**Recolección (K):** 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 308
**Procedencia:** Masma (Lugo)
**Latitud:** 43º 25'
**Longitud:** 7º 21'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 1 abril
**Floración (F2):** 15 abril
**Recolección (K):** 30 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Tardía

**Número de identificación en la colección:** 309
**Procedencia:** Masma (Lugo)
**Latitud:** 43º 25'
**Longitud:** 7º 21'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 5 abril
**Recolección (K):** 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** planos convergentes, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ramona

**Número de identificación en la colección:** 312
**Procedencia:** Masma (Lugo)
**Latitud:** 43º 25'
**Longitud:** 7º 21'
**Altitud:** 100 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** salpicada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 314
**Procedencia:** Guitiriz (Lugo)
**Latitud:** 43º 10'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 420 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 mayo
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 23 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Dulce Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 317
**Procedencia:** Sabadelle (Lugo)
**Latitud:** 42º 36'
**Longitud:** 7º 46'
**Altitud:** 557 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 23 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 4 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Pero de Invierno

**Número de identificación en la colección:** 318
**Procedencia:** Chantada (Lugo)
**Latitud:** 42º 36'
**Longitud:** 7º 46'
**Altitud:** 483 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 17 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 320
**Procedencia:** Chantada (Lugo)
**Latitud:** 42º 36'
**Longitud:** 7º 46'
**Altitud:** 483 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Bella Colorada

**Número de identificación en la colección:** 321
**Procedencia:** Piñeira (Lugo)
**Latitud:** 42º 27'
**Longitud:** 7º 17'
**Altitud:** 430 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 12 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ferroi

**Número de identificación en la colección:** 322
**Procedencia:** Quinte (Lugo)
**Latitud:** 42º 56'
**Longitud:** 7º 25'
**Altitud:** 425 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):**
**Floración (F2):** 5 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Leuros

**Número de identificación en la colección:** 323
**Procedencia:** Quinte (Lugo)
**Latitud:** 42º 56'
**Longitud:** 7º 25'
**Altitud:** 425 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 5 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 324
**Procedencia:** Quinte (Lugo)
**Latitud:** 42º 56'
**Longitud:** 7º 25'
**Altitud:** 425 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Peros

**Número de identificación en la colección:** 325
**Procedencia:** Quinte (Lugo)
**Latitud:** 42º 56'
**Longitud:** 7º 25'
**Altitud:** 425 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 27 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Septiembre

**Número de identificación en la colección:** 326
**Procedencia:** Saá (Lugo)
**Latitud:** 43º 00'
**Longitud:** 7º 33'
**Altitud:** 520 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 marzo
**Floración (F2):** 2 abril
**Recolección (K):** 3 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tempera

**Número de identificación en la colección:** 327
**Procedencia:** Saá (Lugo)
**Latitud:** 43º 00'
**Longitud:** 7º 33'
**Altitud:** 520 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 3 mayo
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** salpicada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Coro

**Número de identificación en la colección:** 329
**Procedencia:** Recimil (Lugo)
**Latitud:** 43º 00'
**Longitud:** 7º 33'
**Altitud:** 481 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 11 abril
**Floración (F2):** 17 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 330
**Procedencia:** Recimil (Lugo)
**Latitud:** 43º 00'
**Longitud:** 7º 33'
**Altitud:** 481 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 331
**Procedencia:** Muñis (Lugo)
**Latitud:** 42º 57'
**Longitud:** 7º 00'
**Altitud:** 423 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 24 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** ataque fuerte
**Raíces aéreas:** ataque fuerte
**Momificado:** ataque fuerte
**Pulgón lanígero:** ataque fuerte

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** ataque fuerte
**Chancro:** no presenta

## Parecida a Starking

**Número de identificación en la colección:** 332
**Procedencia:** Becerreá (Lugo)
**Latitud:** 42º 51'
**Longitud:** 7º 09'
**Altitud:** 641 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 10 abril
**Floración (F2):** 19 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Parecida a Carapanón

**Número de identificación en la colección:** 333
**Procedencia:** Rececende (Lugo)
**Latitud:** 43º 21'
**Longitud:** 7º 11'
**Altitud:** 200 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 4 abril
**Recolección (K):** 20 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Regalada

**Número de identificación en la colección:** 335
**Procedencia:** Louseiro (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 535 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 20 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 336
**Procedencia:** Louseiro (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 535 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 337
**Procedencia:** Louseiro (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 535 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 mayo
**Floración (F2):** 27 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Espiño Mol

**Número de identificación en la colección:** 338
**Procedencia:** Louseiro (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 535 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 2 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Piel de Sapo

**Número de identificación en la colección:** 340
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 18 abril
**Floración (F2):** 24 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Dulce

**Número de identificación en la colección:** 341
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 19 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 343
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 26 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 344
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 29 marzo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** amarilla-crema
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 346
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 abril
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Bilbaina

**Número de identificación en la colección:** 347
**Procedencia:** Veiga(Santiago) (Lugo)
**Latitud:** 42º 46'
**Longitud:** 7º 24'
**Altitud:** 512 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Invierno

**Número de identificación en la colección:** 349
**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 mayo
**Floración (F2):** 1 junio
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Do País o Perdices

**Número de identificación en la colección:** 350
**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 27 abril
**Floración (F2):** 19 mayo
**Recolección (K):** 19 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque medio
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 351
**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 1 abril
**Recolección (K):** 27 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 352
**Procedencia:** Baamorto (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** elíptico-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 353
**Procedencia:** Baamorto (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 411 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 5 abril
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 354
**Procedencia:** Baamorto (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 411 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 4 abril
**Floración (F2):** 18 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a De Cera

**Número de identificación en la colección:** 355
**Procedencia:** Baamorto (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 411 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 6 abril
**Floración (F2):** 22 abril
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 356
**Procedencia:** Tor (S.Xulian) (Lugo)
**Latitud:** 42º 31'
**Longitud:** 7º 30'
**Altitud:** 364 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Belarda Blanca

**Número de identificación en la colección:** 358
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 2 mayo
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Belarda Roja

**Número de identificación en la colección:** 359
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 29 abril
**Floración (F2):** 23 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque fuerte

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Tabardilla

**Número de identificación en la colección:** 361
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 abril
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** crema-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 362
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 25 marzo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 363
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 16 abril
**Floración (F2):** 26 abril
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a rayas, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# De San Roque

**Número de identificación en la colección:** 364
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Coruñesa

**Número de identificación en la colección:** 365
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):**
**Floración (F2):** 2 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Sangre de Toro

**Número de identificación en la colección:** 366
**Procedencia:** Magazos (Lugo)
**Latitud:** 43º 39'
**Longitud:** 7º 35'
**Altitud:** 52 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 26 abril
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 367
**Procedencia:** Cereixido (Lugo)
**Latitud:** 43º 07'
**Longitud:** 7º 03'
**Altitud:** 485 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque fuerte
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Temprana

**Número de identificación en la colección:** 369
**Procedencia:** Cereixido (Lugo)
**Latitud:** 43º 07'
**Longitud:** 7º 03'
**Altitud:** 485 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 20 abril
**Floración (F2):** 15 mayo
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** desconocido
**Chapa:** desconocido
**Forma:** desconocido
**Tamaño:** desconocido
**Epidermis:** pruina en su superficie y con presencia de cera
**Sensibilidad al russeting:** desconocido
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.
**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** desconocido
**Firmeza de la pulpa:** desconocido
**Textura de la pulpa:** desconocido
**Jugosidad:** desconocido
**Sabor:** desconocido
**Aroma:** desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta
**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 370
**Procedencia:** Baños de Molgas (Ourense)
**Latitud:** 42º 14'
**Longitud:** 7º 40'
**Altitud:** 611 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanco-crema-rosado
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 371
**Procedencia:** Suatorre (Ourense)
**Latitud:** 42º 14'
**Longitud:** 7º 40'
**Altitud:** 611 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 25 marzo
**Recolección (K):** 25 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** salpicada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** erectos, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Mandarina

**Número de identificación en la colección:** 372
**Procedencia:** Vieiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 08'
**Longitud:** 7º 57'
**Altitud:** 440 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 29 marzo
**Recolección (K):** 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Sangre de Toro

**Número de identificación en la colección:** 373
**Procedencia:** Vieiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 08'
**Longitud:** 7º 57'
**Altitud:** 440 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 11 abril
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 374
**Procedencia:** Vieiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 08'
**Longitud:** 7º 57'
**Altitud:** 440 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 22 marzo
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 20 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Rabal

**Número de identificación en la colección:** 375
**Procedencia:** Vieiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 08'
**Longitud:** 7º 57'
**Altitud:** 440 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 26 marzo
**Recolección (K):** 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 376.1
**Procedencia:** Allariz (Ourense)
**Latitud:** 42º 11'
**Longitud:** 7º 47'
**Altitud:** 375 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** desconocido
**Moteado:** desconocido
**Raíces aéreas:** desconocido
**Momificado:** desconocido
**Pulgón lanígero:** desconocido

**Pulgón verde:** desconocido
**Araña roja:** desconocido
**Chancro:** desconocido

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 376.2
**Procedencia:** Allariz (Ourense)
**Latitud:** 42º 11'
**Longitud:** 7º 47'
**Altitud:** 375 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera elevada
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** desconocido
**Moteado:** desconocido
**Raíces aéreas:** desconocido
**Momificado:** desconocido
**Pulgón lanígero:** desconocido

**Pulgón verde:** desconocido
**Araña roja:** desconocido
**Chancro:** desconocido

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 377
**Procedencia:** Xunqueira de Ambia (Ourense)
**Latitud:** 42º 12'
**Longitud:** 7º 44'
**Altitud:** 534 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 8 abril
**Floración (F2):** 1 mayo
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** agudo
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** no presenta
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 378
**Procedencia:** Xunqueira de Ambia (Ourense)
**Latitud:** 42º 12'
**Longitud:** 7º 44'
**Altitud:** 534 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 379
**Procedencia:** Allariz (Ourense)
**Latitud:** 42º 11'
**Longitud:** 7º 47'
**Altitud:** 375 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):**
**Floración (F2):** 12 mayo
**Recolección (K):** 3 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** harinosa
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 381
**Procedencia:** Monterrei (Ourense)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 7º 27'
**Altitud:** 523 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 382
**Procedencia:** Mosteiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 25'
**Longitud:** 6º 59'
**Altitud:** 522 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 28 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** verde
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** desconocido
**Disposición de los sépalos:** desconocido.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** desconocido
**Pedúnculo (grosor y longitud):** desconocido
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** desconocido
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 383
**Procedencia:** Mosteiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 25'
**Longitud:** 6º 59'
**Altitud:** 522 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 30 marzo
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 384
**Procedencia:** Mosteiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 25'
**Longitud:** 6º 59'
**Altitud:** 522 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** salpicada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** superpuestos entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 385
**Procedencia:** Mosteiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 25'
**Longitud:** 6º 59'
**Altitud:** 522 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 20 abril
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 387
**Procedencia:** Caldesiños (Ourense)
**Latitud:** 42º 10'
**Longitud:** 7º 06'
**Altitud:** 833 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 15 marzo
**Floración (F2):** 1 abril
**Recolección (K):** 30 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca-crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque medio
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 388
**Procedencia:** Ventas de Cerdeira (Ourense)
**Latitud:** 42º 03'
**Longitud:** 7º 08'
**Altitud:** 1073 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 1 abril
**Recolección (K):** 30 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 390
**Procedencia:** Partovia (Ourense)
**Latitud:** 42º25'
**Longitud:** 8º 04'
**Altitud:** 278 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 14 abril
**Recolección (K):** 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:**
**Forma del ápice del limbo:** desconocido
**Forma de la base del limbo:** desconocido
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque débil
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 391
**Procedencia:** Partovia (Ourense)
**Latitud:** 42º25'
**Longitud:** 8º 04'
**Altitud:** 278 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 10 mayo
**Recolección (K):** 20 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** lavada, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 392
**Procedencia:** Partovia (Ourense)
**Latitud:** 42º25'
**Longitud:** 8º 04'
**Altitud:** 278 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 13 mayo
**Recolección (K):** 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 393
**Procedencia:** Partovia (Ourense)
**Latitud:** 42º25'
**Longitud:** 8º 04'
**Altitud:** 278 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 28 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** biserrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 394
**Procedencia:** Barrio (Ourense)
**Latitud:** 42º 27'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 452 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 29 marzo
**Recolección (K):** 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** a manchas, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura suave, con pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** mucronado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ros Alargada

**Número de identificación en la colección:** 395
**Procedencia:** Barrio (Ourense)
**Latitud:** 42º 27'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 452 m.

**Destino:** Conservación en el Banco
FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 17 marzo
**Floración (F2):** 19 abril
**Recolección (K):** 6 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# Ros Redonda

**Número de identificación en la colección:** 397
**Procedencia:** Barrio (Ourense)
**Latitud:** 42º 27'
**Longitud:** 7º 53'
**Altitud:** 452 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 11 abril
**Recolección (K):** 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque medio
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 399
**Procedencia:** Regadas (Ourense)
**Latitud:** 42º 19'
**Longitud:** 8º 07'
**Altitud:** 249 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 25 abril
**Floración (F2):** 18 mayo
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** ataque débil
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 400
**Procedencia:** Leiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 08'
**Altitud:** 108 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** desconocido
**Recolección (K):** 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** roja
**Chapa:** a rayas, intensidad fuerte
**Forma:** plana
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** erectos, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** muy profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Color de la pulpa:** blanco-rosado
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** estrecha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** larga

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 401
**Procedencia:** Leiro (Ourense)
**Latitud:** 42º 17'
**Longitud:** 8º 08'
**Altitud:** 108 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 30 marzo
**Recolección (K):** 12 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** oblongo-cónica
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y estrecha
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** poco aroma

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** obtuso
**Presencia de subestípulas:** presentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque fuerte
**Moteado:** ataque medio
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 402
**Procedencia:** S. Roque (Ourense)
**Latitud:** 42º 23'
**Longitud:** 7º 05'
**Altitud:** 427 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 3 abril
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** completamente replegados, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** estrecho y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** media
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** ataque débil
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** ataque débil

# Parecida a Golden

**Número de identificación en la colección:** 403
**Procedencia:** Baltar (Ourense)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 7º 43'
**Altitud:** 821 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 21 abril
**Floración (F2):** 6 mayo
**Recolección (K):** 30 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** intermedia-cónica
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera media
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** parcialmente replegados, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Color de la pulpa:** crema
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** larga
**Máxima anchura del limbo:** ancha
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** ondulado
**Forma del ápice del limbo:** cuspidado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** larga
**Anchura de los pétalos:** ancha
**Disposición de los pétalos:** libres entre sí
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Parecida a Granny Smith

**Número de identificación en la colección:** 404
**Procedencia:** Baltar (Ourense)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 7º 43'
**Altitud:** 821 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 13 marzo
**Floración (F2):** 9 mayo
**Recolección (K):** 12 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** lavada, intensidad pálida
**Forma:** globoso-cónica
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura desigual, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** grandes
**Disposición de los sépalos:** variable, libres en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y largo
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** profunda y media
**Color de la pulpa:** amarilla
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** seca
**Sabor:** acidez media-baja
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** media
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** desconocido

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 405
**Procedencia:** Baltar (Ourense)
**Latitud:** 41º 56'
**Longitud:** 7º 43'
**Altitud:** 821 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 8 mayo
**Recolección (K):** 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** amarillo
**Chapa:** sin chapa
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** medio
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** medianas
**Disposición de los sépalos:** variable, variable en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y media
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** intermedia
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** estrecha
**Longitud de las estípulas**: corta
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** agudo
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** corta
**Anchura de los pétalos:** estrecha
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** no presenta
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque débil

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## Desconocida

**Número de identificación en la colección:** 406
**Procedencia:** Sta. Comba (Ourense)
**Latitud:** 42º 01'
**Longitud:** 7º 58'
**Altitud:** 610 m.

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** desconocido
**Floración (F2):** 2 abril
**Recolección (K):** 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** completa, intensidad fuerte
**Forma:** oblonga
**Tamaño:** pequeño
**Epidermis:** de textura suave, sin pruina en su superficie y con presencia de cera débil
**Sensibilidad al russeting:** muy poco sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** Erectos convergentes, en contacto en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** poco profunda y estrecha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** grueso y corto
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** poco profunda y media
**Color de la pulpa:** verde
**Firmeza de la pulpa:** firme
**Textura de la pulpa:** Crocante
**Jugosidad:** jugosa
**Sabor:** acidez alta
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** media
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: media
**Máxima anchura de las estípulas:** desconocido
**Denticulación del borde del limbo:** biondulado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** cordiforme
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** desconocido
**Anchura de los pétalos:** desconocido
**Disposición de los pétalos:** desconocido
**Longitud del pedúnculo:** corta

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** ataque débil
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** no presenta

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

## De Puebla

**Número de identificación en la colección:** 407
**Procedencia:** desconocida
**Latitud:** no disponible
**Longitud:** no disponible
**Altitud:** no disponible

**Destino:** Conservación en el Banco

FENOLOGIA
**Brotación (C3):** 31 marzo
**Floración (F2):** 25 abril
**Recolección (K):** desconocido

CARACTERES DEL FRUTO
**Color:** bicolor
**Chapa:** a rayas, intensidad media
**Forma:** plana-globosa
**Tamaño:** grande
**Epidermis:** de textura desigual, con pruina en su superficie y con presencia de cera nula
**Sensibilidad al russeting:** medianamente sensible
**Tamaño lenticelas:** pequeñas
**Disposición de los sépalos:** variable, superpuestos en su base.

**Fosa calicina (profundidad y anchura):** profunda y ancha
**Pedúnculo (grosor y longitud):** medio y medio
**Cavidad peduncular (profundidad y anchura):** media y media
**Color de la pulpa:** blanca
**Firmeza de la pulpa:** suave
**Textura de la pulpa:** intermedia
**Jugosidad:** intermedia
**Sabor:** débil
**Aroma:** aromática

CARACTERES DE LA HOJA
**Longitud del limbo:** corta
**Máxima anchura del limbo:** media
**Longitud de las estípulas**: larga
**Máxima anchura de las estípulas:** ancha
**Denticulación del borde del limbo:** serrado
**Forma del ápice del limbo:** acuminado
**Forma de la base del limbo:** redondeado
**Presencia de subestípulas:** ausentes

CARACTERES DE LA FLOR
**Longitud de los pétalos:** media
**Anchura de los pétalos:** media
**Disposición de los pétalos:** en contacto entre sí
**Longitud del pedúnculo:** media

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
**Oidio:** ataque débil
**Moteado:** no presenta
**Raíces aéreas:** no presenta
**Momificado:** no presenta
**Pulgón lanígero:** ataque medio

**Pulgón verde:** ataque medio
**Araña roja:** no presenta
**Chancro:** no presenta

# CONCLUSIONES

Se han estudiado 408 accesiones de manzano recogidas en la comunidad gallega como material autóctono y 32 cultivares comerciales que han servido de comparación. De los estudios de variabilidad morfológica e isoenzimática se presentan en este trabajo 350 fichas varietales. Todas ellas presentaron diferencias al nivel morfológico y/o isoenzimático que demostraron su singularidad. El resto de las fichas varietales se han eliminado por ser repeticiones de alguna de las anteriores.

Por tanto, el nivel de variabilidad encontrado ha sido elevado, ya que un 86% de las introducciones sn originales, las cuales se recomienda conservar en el Banco de Germoplasma para preservar la variabilidad. Considerando la variabilidad por provincias, en A Coruña se propone conservar 162 de 189, en Lugo 61 de 74, en Ourense 36 de 38, en Pontevedra 88 de 104, otras 3 son de origen desconocido. Es decir, en A Coruña, Lugo y Pontevedra se recomienda preservar entre un 82 y un 86% de la variabilidad encontrada, y algo más, el 95%, en Ourense. El material a conservar proviene de zonas comprendidas entre el nivel del mar y los 1100 m.

De las 350 fichas presentadas, 53 describen los clones preseleccionados para posteriores ensayos comparativos. Estas fichas varietales corresponden a las cuatro provincias gallegas, 29 de A Coruña, 8 de Lugo, 3 de Ourense, 12 de Pontevedra y l de origen gallego desconocido. Los rangos de altitudes de las preselecciones van desde el nivel del mar hasta los 569 m.

De los 20 cultivares de los que existían descripciones previas, 12 (un 60%) presentan coincidencias con los resultados de este trabajo, lo que parece indicar que estos individuos recogidos en el Banco de Germoplasma del CIAM corresponden a variedades bien definidas: Camoesa, Esperiega de Ademuz, Jose Antonio, Morro de

Liebre, Pedra Dura, De Príncipe, Ramona, Rayadas, Redondela, Repinaldo, Sangre de Toro, y Tres en Ramo o Tres en Cunca. Los cultivares Agosto, Colmadronas, Repinaldo, Santiaguera y Verde o Verdosa no presentaron coincidencia con resultados previos.

Los cultivares son en su mayoría policlonales, por lo que debe ser recomendada la selección clonal dentro de cultivares. Ejemplos de este tipo han sido los cultivares Blanca, Peros, Reinetas y Tabardillas, y Rojas. Dentro de las Rojas, los individuos denominados Roja de Julio presentaron una mayor uniformidad en la descripción.

Dentro de las manzanas preseleccionadas, el grupo de clones que producen manzanas bicolores es el más numeroso, 27, seguido de las amarillas, 19, siendo el grupo de rojas muy reducido, 7. Existen 13 clones que producen manzanas ácidas de interés exclusivo para la elaboración de sidra, otros 14 producen manzanas que además de determinado nivel de acidez, tienen también un elevado dulzor, por lo que pueden tener una utilización mixta, mientras que 26 son dulces y presentaron baja acidez y tendrán un destino para la producción de manzana de mesa.

## AGRADECIMIENTOS

Al Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, por haber facilitado todas las iniciativas de recogida, conservación y estudio de las variedades locales de frutales. D. Manuel Ponte inició esta Colección y D. Santiago Silvar y D. Jesús Tubío Ces la recogida directa del material. A ellos también les damos las gracias.

Los técnicos FP2 D. Víctor Vázquez Gulías, D. José Ramón González Pérez, y D. Iván Prado Rodríguez, becarios de la Xunta de Galicia, colaboraron en la recogida de muestras y en la toma de datos.

La Xunta de Galicia y el I.N.I.A. han financiado los trabajos necesarios para la realización de la presente monografía mediante los proyectos XUGA 29106A94 (DOG12/1/95) y RF99-019-C2-2 (Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos), respectivamente.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCASÍBAR J., 2000. Estudio y caracterización de las variedades de manzano recogidas en el Banco de Germoplasma frutal gallego del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Lugo.

ASCASÍBAR J., SAU F., PEREIRA S., 1999. La fruticultura de pepita en Galicia: estructura productiva, mercado y costos de producción. ITEA 95(2), 189-201.

BATLLE I., 1993. Linkage of isoenzymic genes with agronomic characters in apple. PhD Thesis. University of London, London.

BORÉ J.M., FLECKINGER J., 1997. Pommiers à cidre, variétés de France. INRA, 771 pp.

CAMBRA R., IBARZ P., 1975. Variedades de manzano en España, An. Aula Dei 13(1-2), 1-97.

CASTROVIEJO S., 1998. Flora ibérica, Vol. 6. Real Jardín Botánico, CSIC, 592 pp.

DAPENA E. 1996. Review of Spanish collections. En: European Malus germplasm. Case, H.J., ed. IPGRI, Rome, p. 42.

FAO, 1999. Production, Crops. Publicado en internet, disponible en http://apps.fao.org.

FERNÁNDEZ J., 1992. Variability in Castanea sativa, C. crenata and interspecific hybrids for GOT, ACO, APS, PGM, PGI, IDH, MDH, SDH isozymes. International Symposium on Population Genetics and Gene conservation, Carcans Maubuisson.

FLECKINGER J., 1964. Phénologie et arboriculture fruitiére. En: Le bon jardinier. Grisvard, P., Chaudun, V.C., ed. La Maison Rustique, Tome I, 2éme partie, Paris, pp. 362-372.

HERRERO J., 1964. Cartografía de frutales en hueso y pepita. Ejemplar mecanografiado, Estación Experimental Aula Dei.

JANICK J., CUMMINS J.N., BROWN S.K., HEMMAT M., 1996. Apples. En: Fruit Breeding, Volume I: Tree and Tropical Fruits. Janick, J., Moore, J.N., eds. John Wiley & Sons, New York, pp. 1-77.

KEULEMANS J., 1993. Perspectives nouvelles en amélioration du pommier. Le Fruit Belge 445, 147-151.

LAFFITTE V., 1918. Album Pomológico de Guipúzcoa. Comisión Especial de Pomología de Guipúzcoa, San Sebastián.

LAFFITTE V., 1920. Las manzanas de cuchillo y sus aplicaciones. Comisión Provincial de Agricultura y de Ganadería de Guipúzcoa, San Sebastián, 111 pp.

LESPINASSE Y., 1992. Le pommier. En: Amélioration des espèces végétales cultivées. Gallais, A., Bannerot, H., ed. INRA, Paris, pp. 579-594.

MANGANARIS A.G. 1989. Isoenzymes as genetic markers in apple breeding. Ph.D. Thesis. University of London, London.

Manganaris, A.G. and F.H. Alston. 1992. Genetics of esterase isoenzymes in Malus. Theor. Appl. Genet. 83:467-475.

MEIJIDE A., 1961. La antigua exportación de agrios en Galicia. Revista de Economía de Galicia Enero-Abril 1961, 4-6.

MORGAN J., RICHARDS A., 1993. The book of apples. Ebury Press, 304 pp.

PEREIRA S., 1994. Selección y Caracterización de Cultivares Tradicionales de Castanea sativa Mill. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

UPOV, 1974. Draft guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability (APPLE). International Union for the Protection of new varieties of plants (UPOV).

WATKINS R., SMITH R.A., 1983. Descriptor list for apple (Malus). IBPGR/CEC AGPR/IBPGR/82/71, EUR 8354/1, 46 pp.

# ANEJO FOTOGRÁFICO: CULTIVARES PRESELECCIONADOS Y A CONSERVAR EN EL BANCO DE GERMOPLASMA

**Figura 2.- 3, Desconocida.Ortigueira**

**Figura 3.- 4, Ollo Landoy. Ortigueira**

**Figura 4.- 5, Peros do Can. Landoi**

**Figura 5.- 6, Marafouza. Ortigueira**

**Figura 6.- 7, Allo Mouro. Landoi**

**Figura 7.- 8, Ardio. Landoi**

**Figura 8.- 9, Parafreir (Suiza). Lubre**

**Figura 9.- 10, Francesa muy grande. Lubre**

**Figura 10. 11, Repinaldo Octubre- Lians**

**Figura 11.- 12, Grande Plana. Crendes**

**Figura 12.- 13, Dulce. Lians**

**Figura 13.- 15, Reineta. Lians**



**Figura 14.- 16, Temprana. Lians**

**Figura 15.- 17, José Antonio. Lians**

**Figura 16.- 18, Grande Dulce. Lubre**

**Figura 17.- 19, Tres en Cunca. Andrade**

**Figura 18.- 21, Tabardilla Francesa. Andrade**

**Figura 19.- 22, Tres en Cunca. S.Juan de Piñeiros**

**Figura 20.- 24, Grande Plana Verde. Crendes**

**Figura 21.- 25, Grandísima Amarilla. Crendes**



**Figura 22.- 26, Julio- Septiembre. S.Juan de Piñeiros**

**Figura 23.- 27, Tardía de Marzo. Andrade**

**Figura 24.- 28, De Cera Agosto. Andrade**

**Figura 25.- 29, Camoesa Fina. Andrade**

**Figura 26.- 30, Tabardilla Francesa. Andrade**

**Figura 27.- 31, José Antonio. Andrade**

**Figura 28.- 32, De Mayo Blanca. Andrade**

**Figura 29.- 33, Mazá Fresca. Andrade**

**Figura 30.- 34, De Pera. Andrade**

**.Figura 31.- 35, Roja de Julio. Andrade**



**Figura 32.- 37, Romana, Andrade**

**Figura 33.- 38, José Antonio.Lubre**



**Figura 34.- 39, Pero Canela. Lubre**

**Figura 35.- 40, Blanca Estriada. Lubre**

**Figura 36.- 41, Camoesa, Lians**

**Figura 37.- 42, De Príncipe. Pontedeume**

**Figura 38.- 43, Morenas. Nogueirosa**

**Figura 39.- 44, Asturias. Nogueirosa**

**Figura 40.- 45, Tres en Cunca. Nogueirosa**

**Figura 41.- 46, Cobadia. Burricios**



**Figura 42.- 47, Santa María. Oza dos Ríos**

**Figura 43.- 48, Grande Plana. Burricios**

**Figura 44.- 49, Santiaguesa.Oza dos Ríos**

**Figura 45.- 51, Tabardilla Parda. Oza dos Ríos**

**Figura 46.- 52, Blanca Plana. Burricios**

**Figura 47.- 55, Tabardilla Tardía. Laraxe**

**Figura 48.- 56, Muy Grande. Pobra de Brollón**

**Figura 49.- 57, Blancas.Pontedeume**

**Figura 50.- 61, Santiaguesas. Oza dos Ríos**

**Figura 51.- 62, Muy Grande Aplanada. Doroña**

**Figura 52.- 65, Manzana de Invierno. Doroña**

**Figura 53.- 66, Tabardilla Roja. Doroña**

**Figura 54.- 67, Repinaldo Rojo. Doroña**

**Figura 55.- 68, Reineta. Doroña**

**Figura 56.- 69, Blanca Cerosa. Doroña**

**Figura 57.- 71, Grande Plana Estriada. Doroña**

**Figura 58.- 72, Sangre de Toro. Doroña**



**Figura 59.- 73, Blanca Rojo. Doroña**

**Figura 60.- 74, Tabardilla Blanca. Doroña**

**Figura 61.- 75, Repinaldo Branca. Doroña**

**Figura 62.- 77, Arriscadas. Reboredo**

**Figura 63.- 79, Parecida a José Antonio. Revolta**

**Figura 64.- 80, Blanca. Revolta**



**Figura 65.- 82, Camba. Rodeiro**

**Figura 66.- 83, Pequeña Verde. Crendes**

**Figura 67.- 84, Sangre de Toro. Andrade**

**Figura 68.- 85, Tres en Cunca. Andrade**

**Figura 69.- 86, Plátano. Nogueirosa**

**Figura 70.- 87, Tarde. Nogueirosa**

**Figura 71.- 88,Tabardilla Romana. Nogueirosa**

**Figura 72.- 89, Camoesa Dulce Septbre. Nogueirosa**

**Figura 73.- 90, Roja de Julio. Lubre**

**Figura 74.- 91, Desconocida. Cambre**

**Figura 75.- 92, Blanca de Julio. Nogueirosa**

**Figura 76.- 93, Roja Estriada. Crendes**

**Figura 77.- 94, Reinetas. Nogueirosa**

**Figura 78.- 95, Repinaldo. Nogueirosa**

**Figura 79.- 96, Príncipe Grande. Nogueirosa**

**Figura 80.- 97, Temprana. Laiño**

**Figura 81.- 99, Verdosa Temprana. P. de Brollón**

**Figura 82.- 100, Verdosa Septiembre. Veiga**

**Figura 83.- 101, Pontellas, Crendes**

**Figura 84.- 102, Blancas 2º Julio. Sillobre**

**Figura 85.- 103, Desconocida. Rus**

**Figura 86.- 104, De Julio. Leixa**

**Figura 87.- 105, Desconocida, Burricios**

**Figura 88.- 106, Repinaldo. Carballo**



**Figura 89.- 108, Negras. Carballo**

**Figura 90.- 109, Rojas. Carballo**

**Figura 91.- 110, Desconocida. Nogueirosa**



**Figura 92.- 111, Troncocónicas. Nogueirosa**

**Figura 93.- 113, Blandas Rayas. Nogueirosa**

**Figura 94.- 114, Repinaldo Septiembre. Nogueirosa**

**Figura 95.- 115, Tardías. Nogueirosa**

**Figura 96.- 116, Agosto. Nogueirosa**

**Figura 97.- 118, Peros. Senra**

**Figura 98.- 119, Peraza. Senra**

**Figura 99.- 120, Desconocida. Senra**

**Figura 100.- 122, Pedra Dura. Senra**

**Figura 101.- 124, Ollo Blanco. Senra**

**Figura 102.- 125, Temprana Blanca. Senra**

**Figura 103.- 126, Parecida José Amtonio. Senra**

**Figura 104.- 127, Roja. Senra**

**Figura 105.- 128, De San Juan Roja. Senra**

**Figura 106.- 129, Pero, Senra**

**Figura 107.- 131, Desconocida. Senra**

**Figura 108.- 132, De Agosto. Senra**

**Figura 109.- 133, Desconocida. Loiba**

**Figura 110.- 135, Santiaguesa. Burricios**

**Figura 111.- 136, Desconocida, Burricios**

**Figura 112.- 137, Desconocida. Burricios**

**Figura 113.- 138, Desconocida. Burricios**

**Figura 114.- 139, Repinaldo. Burricios**

**Figura 115.- 140, Desconocida. Herbón**

**Figura 116.- 141, De Rayas. Herbón**

**Figura 117.- 142, Desconocida. Herbón**

**Figura 118.- 143, De Julio. Herbón**

**Figura 119.- 145, Pero Dulce. Herbón**

**Figura 120.- 147, Tabardilla Blanca. Herbón**

**Figura 121.- 148, Temprana. Herbón**

**Figura 122.- 149, Desconocida. Herbón**

**Figura 123.- 150, Desconocida. Herbón**

**Figura 124.- 151, De Invierno. Herbón**



**Figura 125.- 152, Desconocida. Herbón**

**Figura 126.- 154, De Libra. Herbón**

**Figura 127.- 155, De Noya. Dodro**

**Figura 128.- 156, Blanca Plana. Dodro**

**Figura 129.- 157, Roja Muy Fuerte. Dodro**

**Figura 130.- 159, Parecida Tabardilla. Noia**

**Figura 131.- 160, Desconocida. Noia**

**Figura 132.- 161, Desconocida. Noia**

**Figura 133.- 162, Mediana Agosto. Noia**

**Figura 134.- 163, De Agosto. Noia**

**Figura 135.- 164, Tabardilla Parda. Noia**

**Figura 136.- 165, De Septiembre. Noia**

**Figura 137.- 166, Parecida Tabardilla. Noia**

**Figura 138.- 167, De Agosto. Noia**

**Figura 139.- 168, Desconocida. Noia**

**Figura 140.- 169, Desconocida. Noia**

**Figura 141.- 170, Roja Plana. Noia**

**Figura 142.- 171, Desconocida. Noia**

**Figura 143.- 172, Cacharela. Santa Mº de Roo**

**Figura 144.- 173, Muleiriña. Santa Mª de Roo**

**Figura 145.- 174, Tabardilla. Santa Mª de Roo**

**Figura 146.- 175, Tabardilla Antigua. Santa Mª de Roo**

**Figura 147.- 176, Peiro. Santa Mª de Roo**

**Figura 148.- 177, Esperiega Ademuz. Santa Mª de Roo**

**Figura 149.- 179, Desconocida. Santa Mª de Roo**

**Figura 150.- 181, Tabardilla. Santa Mª de Roo**

**Figura 151.- 182, Rabala, Santa Mª de Roo**



**Figura 152.- 183, Desconocida. Santa Mª de Roo**

**Figura 153.- 185, Do Cú Negro. Sata Mª de Roo**

**Figura 154.- 186, Desconocida. Santa Mª de Roo**

**Figura 155.- 187, Tabardilla Blanca. Sta Mª Roo**

**Figura 156.- 188, Desconocida. Santa Mª de Roo**

**Figura 157.- 189, Desconocida. Santa Mª de Roo**

**Figura 158.- 190, De Canle. Santa Mª de Roo**



**Figura 159.- 194, Verdellas. Reboredo**

**Figura 160.- 195, Duras. Reboredo**

**Figura 161.- 196, Parecida de Cera. Sigrás**

**Figura 162.- 197, Desconocida. Sigrás**

**Figura 163.- 198, Parecida Repinaldo. Saidres**



**Figura 164.- 199, Folla. Saidres**

**Figura 165.- 200, Rayada de Asturias. Saidres**

**Figura 166.- 201, Negras. Breixa**

**Figura 167.- 202, Tardías de Octubre.Breixa**

**Figura 168.- 203, San Lorenzo. Breixa**

**Figura 169.- 205, Tres en Rama. Breixa**

**Figura 170.- 206, Desconocida. Breixa**

**Figura 171.- 207, Mariñas. Breixa**

**Figura 172.- 208, Desconocida. Breixa**

**Figura 173.- 209, Desconocida. Breixa**

**Figura 174.- 210, Morro de Liebre. Breixa**

**Figura 175.- 211, Santa María. Breixa**

**Figura 176.- 213, Tabardilla. Breixa**

**Figura 177.- 214, De Cedo. Breixa**

**Figura 178.- 216, Do Prado da Cima. Cristimil**

**Figura 179.- 217, Frariñentas. Cristimil**

**Figura 180.- 218, Camoesa Dulce. Cristimil**

**Figura 181.- 219, Pero Dulce. Santeles de Abaixo**

**Figura 182.- 220, Pero Repinaldo. Santelles de Abaixo**

**Figura 183.- 222, Desconocida. Santeles**

**Figura 184.- 223, Freixeirana, Santeles**




**Figura 185.- 225, Pimienta. Ribeira**

**Figura 186.- 226, De Rioboi. Ribeira**

**Figura 187.- 227, Tabardilla Real. Ribeira**

**Figura 188.- 228, Tabardilla Parda. Ribeira**

**Figura 189.- 229. Tardía. Meabía**



**Figura 190.- 230, Temprana. Meabía**

**Figura 191.- 232, Desconocida. Portas**



**Figura 192.- 234, Faba. Portas**

**Figura 193.- 235, Desconocida. Portas**

**Figura 194.- 236, Pero. Portas**

**Figura 195.- 237, Desconocida. Portas**

**Figura 196.- 241, Desconocida. Portas**

**Figura 197.- 242, Amarilla Julio. Portas**

**Figura 198.- 243, Reineta. Portas**

**Figura 199.- 244, De San Juan Roja. La Lomba**

**Figura 200.- 245, Do Apóstol. Cambados**

**Figura 201.- 246, Desconocida. Cambados**

**Figura 202.- 248, Pata de Mula. Insua**

**Figura 203.- 249, Café. Insua**

**Figura 204.- 250, Louriñán. Insua**

**Figura 205.- 251, Xaneira. Insua**



**Figura 206.- 253, Repinaldo. Insua**

**Figura 207.- 254, Vizcaiña. Meaño**

**Figura 208.- 255, Desconocida. Meaño**

**Figura 209.- 256, Toca Pandeiro. Meaño**

**Figura 210.- 257, Roja de Verano. Castrelo**

**Figura 211.- 259, De Puebla**

**Figura 212.- 261, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 213.- 262, Desconocida. Torres Agrelo**



**Figura 214.- 263, Golden Gallega. Torres Agrelo**

**Figura 215.- 264, Camoesa. Torres Agrelo**



**Figura 216.- 265, De San Juan. Torres Agrelo**

**Figura 217.- 266, Parda. Torres Agrelo**

**Figura 218.- 267, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 219.- 268, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 220.- 269, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 221.- 270, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 222.- 272, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 223.- 273, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 224.- 274, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 225.- 275, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 226.- 276, Desconocida. Torres Agrelo**

**Figura 227.- 277, Espleje. Moaña**

**Figura 228.- 278, Paxeta. Moaña**

**Figura 229.- 279, Cregueira. Seixo**

**Figura 230.- 280, Caguleira o Presente. Seixo**

**Figura 231.- 281, Parecida Cox. Lourizán**

**Figura 232.- 282, Albariña. Barbutín**

**Figura 233.- 284, San Antonio. Caselas**

**Figura 234.- 285, Piolla. Caselas**

**Figura 235.- 286, Riscadas. Cerdeira**

**Figura 236.- 287, Riscadas. Cerdeira**



**Figura 237.- 289, Luneda. Cerdeira**

**Figura 238.- 290, Costoya. Cerdeira**

**Figura 239.- 291, Altonobles. Cerdeira**

**Figura 240.- 292, Dulce. Cerdeira**

**Figura 241.- 293, Dos Enfermos. Cerdeira**

**Figura 242.- 294, Mazá de Todo o Ano. Guláns**

**Figura 243.- 295, Desconocida. Vedra**

**Figura 244.- 297, Desconocida. Vedra**

**Figura 245.- 298, Parecida a Golden. Vedra**

**Figura 246.- 299, Desconocida. Vedra**

**Figura 247.- 300, Blanca. Vedra**

**Figura 248.- 302, De Septiembre. Ferreira Vella**

**Figura 249.- 303, Desconocida. Alfoz**



**Figura 250.- 304, Repinaldo. Alfoz**

**Figura 251.- 305, Parecida a R Encarnada. Alfoz**

**Figura 252.- 306, Desconocida. Adelán**

**Figura 253.- 308, Desconocida. Masma**

**Figura 254.- 309,Tardía. Masma**

**Figura 255.- 311, Tardía. Masma**

**Figura 256.- 312, Ramona, Masma**

**Figura 257.- 313, Desconocida. Guitiriz**

**Figura 258.- 314, Desconocida. Guitiriz**

**Figura 259.- 317, Dulce Septiembre. Sabadelle**

**Figura 260.- 318, Pero de Invierno. Chantada**

**Figura 261.- 320, Desconocida. Chantada**

**Figura 262.- 321, Bella Colorada. Piñeira**

**Figura 263.- 322, Ferroi. Quinte**

**Figura 264.- 323, Leuros. Quinte**

**Figura 265.- 324, Desconocida. Quinte**

**Figura 266.- 325, Peros, Quinte**

**Figura 267.- 326, De Septiembre. Saa**

**Figura 268.- 327, Tempera. Saa**

**Figura 269.- 328, Desconocida. Saa**

**Figura 270.- 329, Coro. Recimil**

**Figura 271.- 330, Desconocida. Recimil**

**Figura 272.- 331, Desconocida. Muñis**

**Figura 273.- 332, Parecida a Starking. Becerreá**

**Figura 274.- 334, Reineta. Rececende**

**Figura 275.- 335, Regalada. Louseiro**

**Figura 276.- 336, Desconocida. Louseiro**

**Figura 277.- 337, Desconocida. Louseiro**

**Figura 278.- 338, Espiño Mol. Louseiro**

**Figura 279.- 340, Piel de Sapo, Veiga**

**Figura 280.- 341, Dulce. Veiga**

**Figura 281.- 343, Desconocida. Veiga**

**Figura 282.- 344, Tabardilla. Veiga**

**Figura 283.- 346, Desconocida. Veiga**

**Figura 284.- 347, Bilbaina. Veiga**

**Figura 285.- 349, De Invierno. Tor (S. Xulian)**

**Figura 286.- 350, Do País o Perdices. Tor (S. Xulian)**

**Figura 287.- 351, Desconocida. Tor (S. Xulian)**

**Figura 288.- 352, Desconocida. Baamorto**



**Figura 289.- 354, Desconocida. Baamorto**

**Figura 290.- 355, Parecida a De Cera. Baamorto**



**Figura 291.- 356, Desconocida. Tor (S. Xulián)**

**Figura 292.- 357.- Reina de Reinetas. Magazos**

**Figura 293.- 358.- Belarda Blanca. Magazos**



**Figura 294.- 359, Belarda Roja. Magazos**

**Figura 295.- 360, Peros Blancos. Magazos**

**Figura 296.- 361, Tabardilla. Magazos**

**Figura 297.- 362, Desconocida. Magazos**

**Figura 298.- 363, , Desconocida. Magazos**

**Figura 299.- 364, De San Roque. Magazos**

**Figura 300.- 365, Coruñesa. Magazos**



**Figura 301.- 366, Sangre de Toro. Magazos**

**Figura 302.- 367, Desconocida. Cereixido**

**Figura 303.- 370, Desconocida. Baños de Molgás**

**Figura 304.- 371, Desconocida. Suatorre**

**Figura 305.- 372, Mandarina. Vieiro**

**Figura 306.- 373, Sangre de Toro. Vieiro**

**Figura 307.- 374, Desconocida.Vieiro**

**Figura 308.- 375, Rabal. Vieiro**

**Figura 309.- 376.1, Desconocida. Allariz**

**Figura 310.- 377, Desconocida. Xunqueira de Ambia**

**Figura 311.- 378, Desconocida. X. de Ambia**

**Figura 312.- 379, Desconocida. Allariz**



**Figura 313.- 381, Desconocida. Monterrey**

**Figura 314.- 383, Desconocida. Mosteiro**

**Figura 315.- 384, Desconocida. Mosteiro**



**Figura 316.- 385, Desconocida. Mosteiro**

**Figura 317.- 387, Desconocida. Caldesiños**

**Figura 318.- 388, Desconocida. Ventas de Cerdeira**

**Figura 319.- 389, Santa Marta. Partovia**

**Figura 320.- 390, Desconocida. Partovia**

**Figura 321.- 391, Desconocida. Partovia**

**Figura 322.- 392, Desconocida. Partovia**

**Figura 323.- 393, Desconocida. Partovia**

**Figura 324.- 394, Desconocida. Barrio**

**Figura 325.-395, Ros Alargada. Barrio**

**Figura 326.- 396, Gravillán. Barrio**

**Figura 327.- 397, Ros Redonda. Barrio**

**Figura 328.- 398, Desconocida. Regadas**

**Figura 329.- 399, Desconocida. Regadas**

**Figura 330.- 400, Desconocida. Leiro**

**Figura 331.- 401, Desconocida. Leiro**

**Figura 332.- 402, Desconocida. San Roque**

**Figura 333.- 403, Parecida a Golden. Baltar**



**Figura 334.- 404, Parecida a Granny Smith. Baltar**

**Figura 335.- 405, Desconocida. Baltar**

**Figura 336.- 406, Desconocida. Santa Comba**

**Figura 337.- 407, Desconocida. Santa Comba**