

ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက် ကြေညာချက်

နမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး- သင်သိထားရမည့် အကြောင်းအရာများ

Many vaccine information statements are available in Burmese and other languages.

See www.immunize.org/vis

ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက် ကြေညာချက်များကို ဗမာဘာသာနှင့် အခြားသော ဘာသာစကားများတို့ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ www.immunize.org/vis တွင် ကြည့်ရှုပါ

1. ဘာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးရသလဲ။

နမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေးသည် နျူမိုကောကပ်စ် ရောဂါများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။

နျူမိုကောကပ်စ်ရောဂါ ဆိုသည်မှာ နျူမိုကောကပ်စ် ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဖျားနာမကျန်းဖြစ်မှု မှန်သမျှကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဗက်တီးရီးယားများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အပါအဝင် ရောဂါအမျိုးအစား များစွာကို ဖြစ်စေနိုင်သည်-

- နမိုးနီးယား (အဆုတ်ရောဂါ ပိုးကူးစက်မှု)
- နားရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ
- နှာခေါင်းလမ်းကြောင်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ
- ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ (ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးအာရုံကြောမအပေါ် လွှမ်းခြုံထားသည့် တစ်ရှူးများ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှု)
- သွေးထဲ၌ ဗက်တီးရီးယားပိုးများ ရှိနေခြင်း (သွေးလမ်းကြောင်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှု)

မည်သူမဆို အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ခံစားရနိုင်သော်လည်း ကလေးသူငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အချို့အန္တရာယ်ချက်များရှိသော လူများတွင် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးဖြစ်သည်။

နျူမိုကောကပ်စ် ဗက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးကူးစက်မှု အများစုသည် အပျော့စားကူးစက်မှုသာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့ကူးစက်မှုများမှာ မူ ဦးနှောက်ပျက်စီးထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှု ကဲ့သို့သော ရေရှည်ပြဿနာများအား ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ၊ ဗက်တီးရီးယား ပိုးမွှားများနှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားသော နမိုးနီးယားသည် အသက်သေစေနိုင်လောက်သော ရောဂါများဖြစ်သည်။

2. နမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး

နမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေးသည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်စေသည့် ဗက်တီးရီးယားများရန်မှ ကူညီကာကွယ်ပေးပါသည်။ နမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး (PCVs) အများအပြားရှိသည်။ သီးခြား သက်မှတ်ထားသော PCV နှင့် အကြံပြုထားသော ဆေးထိုးကြိမ်အရေအတွက်သည် လူတစ်ဦး၏ အသက်အရွယ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုး မှတ်တမ်းနှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူသည် သင့်အား မည်သည့် PCV အမျိုးအစားနှင့် ဘယ်နှစ်ကြိမ်ထိုးသင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

- မွေးကင်းစ ကလေးများနှင့် ကလေးငယ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် PCV 4 ကြိမ် ထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆေးများကို အသက် 2၊ 4၊ 6 နှင့် 12-15 လအရွယ်တွင် ထိုးနှံရန် အကြံပြုထားသည်။

- အချို့ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များသည် မွေးကင်းစ ကလေးများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် အကြံပြုထားသည့် ဆေးကို မထိုးနှံခဲ့ရပါက PCV ထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အသက်အရွယ်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
- PCV ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံရသေးသည့် အသက် 19 နှစ်မှ 49 နှစ်ကြား အရွယ်ရောက်ပြီးသူ များနှင့် အချို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ချက်ရှိသူများအနေဖြင့် PCV ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသင့်သည်။ PCV ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးသော ဤအုပ်စုရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအချို့ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဆေးထိုးရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
- ယခင်က PCV ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံရသေးသော အသက် 50 နှစ်နှင့် အထက် လူကြီးများသည် PCV ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသင့်ပါသည်။ PCV ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးသော ဤအုပ်စုရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအချို့ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဆေးထိုးရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။

3. သင့်ကျန်းမာရေး ပြုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခြင်း

ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံမည့်လူသည် အောက်ပါတို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါက သင်၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသူကို ပြောပြပါ-

- ယခင်က PCV ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားတစ်ခုခုကို ထိုးပြီးနောက် ဓာတ်မတည့်သော တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်း၊ ဆုံဆို့နာရောဂါ (ဥပမာ- DTaP) ပါဝင်သော ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် ပြင်းထန်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်မတည့်မှုများ ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့ခြင်း

အချို့သော ဖြစ်ရပ်များတွင် သင်၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူသည် PCV ကာကွယ်ဆေး ရယူမှုကို အခြားတစ်ရက်ရက်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

အအေးမိခြင်းကဲ့သို့ အသေးစား နာမကျန်းဖြစ်နေသူများကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ပါသည်။ အသင့်အတင့် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် နေမကောင်းသူများသည် နေပြန်ကောင်းလာသည်အထိ စောင့်သင့်ပါသည်။

သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူက သင့်ထံ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။



4. ကာကွယ်ဆေးကြောင့် တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေများ

- ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် နေရာတွင် နီမြန်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိမိလျှင် နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နှမိုးနီးယားပိုး ပေါင်းစပ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ အစာစားလိုစိတ် မရှိခြင်း၊ စိတ်လက်မအိမသာဖြစ်ခြင်း (စိတ်တိုခြင်း)၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သား နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း သို့မဟုတ် ချမ်းတုံ့ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

ငယ်ရွယ်သော ကလေးများကို PCV နှင့် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကို ပြိုင်တူထိုးပေးလျှင် ဆေးထိုးပြီးနောက် အဖျားကြောင့် အတက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူထံ မေးမြန်းပါ။

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း အပါအဝင် ဆေးဝါးကုသမှုများအပြီးတွင် လူတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မူးဝေလဲကျတတ်ပါသည်။ သင်မူးဝေခြင်း၊ အမြင်အာရုံ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် နားအူခြင်းဖြစ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။

အခြားသောဆေးဝါးများကိုသို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းအတွက် အလွန်အလွန်နည်းပါးသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။

5. ပြင်းထန်သော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လျှင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ကာကွယ်ဆေးထိုးနံ့ထားသူသည် ဆေးခန်းမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် ဓာတ်မတည့်သော တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့် တုံ့ပြန်မှု လက္ခဏာများ (အနီပြင်ထခြင်း၊ မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းများ ဖောင်းလာခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း) တို့ကို တွေ့ရှိရပါက 9-1-1 သို့ ခေါ်ဆိုပြီး ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်အား အနီးဆုံးဆေးရုံသို့ ပို့ပါ။

သင်စိတ်ပူသော အခြားလက္ခဏာများအတွက် သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူထံ ဖုန်းခေါ်ပါ။

ဆိုးရွားသော ဓာတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုများအား Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ကာကွယ်ဆေး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အဖြစ်အပျက် သတင်းပို့ရန် စနစ်) သို့ တင်ပြသင့်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဤအစီရင်ခံစာကို တင်ပြမည်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ပါက သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ VAERS ဝဘ်ဆိုက် www.vaers.hhs.gov သို့ ဝင်ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် 1-800-822-7967 ကို ခေါ်ဆိုပါ။ VAERS သည် တုံ့ပြန်မှုများကို အစီရင်ခံရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး၊ VAERS ဝန်ထမ်းများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ မပေးပါ။

Burmese translation provided by Immunize.org

6. National Vaccine Injury Compensation Program

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးရေး နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်) သည် ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုခုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူအား လျော်ကြေးပေးရန် ရေးဆွဲထားသော ပြည်ထောင်စု အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားသည့် ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် အသက်သေဆုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများအတွက် လျှောက်ထားရန် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိပြီး ယင်းမှာ အနည်းဆုံး 2 နှစ်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစီအစဉ်အကြောင်း လေ့လာရန်နှင့် မကျေနပ်ချက်ကို တင်ပြရန်အတွက် VICP ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သည့် www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို့ သွားပါ သို့မဟုတ် 1-800-338-2382 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

7. ဘယ်လိုမျိုး နောက်ထပ် လေ့လာနိုင်သလဲ။

- သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူထံ မေးမြန်းပါ။
- သင်၏ ဒေသန္တရ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ခေါ်ဆိုပါ။
- ကာကွယ်ဆေး ပက်ကေ့ချ် ထိုးနှံမှုအတွက် Food and Drug Administration (FDA) အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဌာန) ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားရောက်ပြီး နောက်ထပ်အချက်အလက်ကို www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines တွင် လေ့လာပါ။
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုဌာန) သို့ ဆက်သွယ်ပါ - ဖုန်း 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို့ ခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် - CDC ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.cdc.gov/vaccines