



EMBOLISME MÚLTIPLE SECUNDARI A CIRURGIA DE CARÒTIDA

Carolina Rius Tornés, Mei Alegre Martínez, Ferran Llanas Alegre, Carlota Salvador Miras, Marta Bové Guri

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Introducció: Presentem un cas d'un pacient amb múltiples èmbols retinians que es van produir secundaris a una cirurgia de caròtides. L'alliberació d'èmbols no és infreqüent en aquest tipus de cirurgies, però no és tan comú que provoquin simptomatologia permanent als pacients. **Cas clínic:** Pacient de 62 anys que consulta per un escotoma nasal inferior en ull dret d'una setmana d'evolució. Coincideix amb que fa dues setmanes es va sotmetre a una endarterectomia per una estenosi del 90% de l'artèria caròtida dreta. A l'exploració presenta una agudesa visual del 0.7 i un defecte inferior en el camp visual dret. Al fons d'ull s'observa la retina superior pàl·lida amb múltiples èmbols (més de 8) impactats en branques vasculars superiors, centrals i perifèrics. El pacient va experimentar dèficits visuals altitudinals intermitents en el post operatori immediat, que van ser orientats com a accidents isquèmics transitoris i no es va realitzar estudi oftalmològic posterior. **Conclusió:** Els embolismes secundaris a cirurgia carotídia són freqüents i fins un 15% poden arribar a la retina. Malgrat això, no és comú que l'afectació sigui simptomàtica al tractar-se d'afectacions microvasculars i perifèriques. En qualsevol cas, davant un pacient que presenta defectes visuals postoperatoris és recomanable la valoració oftalmològica de manera precoç.

